

醫

宗

必

讀

宛委山房重校醫宗必讀卷之八

雲間李中梓士材父著

門人李玄度公超父參

姪孫李廷芳蘅伯父訂

頭痛

經曰風氣循風府而上則爲腦風新沐中風則爲首風首風之
狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其
風日則病少愈風府者督脉穴入項髮際一寸太陽之脉連于
沐則勝開風客乃爲首風風傷衛則汗出而惡風風爲陽邪故
先風一日則病發先甚者亦先衰故至其風日則病少愈也
頭痛數歲不已當犯大寒內至骨髓髓以腦爲主腦逆故頭痛
齒亦痛名曰厥逆髓以腦爲主者諸髓皆屬於腦也大寒入髓
者骨之餘也故頭痛齒亦逆頭痛顛疾下虛上實過在足少陰巨
陽痛是邪逆於上故名厥逆頭痛巨陽病也太陽之脉交蹠上其支別者從顛至耳上角
陽其直行者從顛入絡腦下虛少陰腎虛也上實巨陽勝於實

也腎虛不能攝巨陽之氣頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生者
故虛邪上行而爲頭痛也耳鳴也九竅不利者氣虛不能達也腸胃
者七衝門之道路氣之所以往來者也氣虛則不能上升於顛
頂故頭痛甚則腦盡痛手足寒至節死不治三陽受邪伏而不
起手足之寒故手足之寒上至於節也

愚按經之論頭痛風也寒也虛也運氣論頭痛十條傷寒論太
陽頭痛一條皆六氣相侵與真氣相薄經氣逆上干於清道不
得運行壅遏而痛也頭爲天象六府清陽之氣五藏精華之血
皆會於此故天氣六淫之邪人氣五賊之變皆能相害或蔽覆
其清明或瘀塞其經絡與氣相薄鬱而成熱脉滿而痛若邪氣
稽留脉滿而氣血亂則痛乃甚此實痛也寒溼所侵真氣虛弱
雖不相薄成熱然邪客於脉外則血泣脉寒卷縮緊急外引小
絡而痛得溫則痛止此虛痛也因風痛者抽掣惡風因熱痛者

煩心惡熱因濕痛者頭重而天陰轉甚因痰痛者昏重而欲吐不休因寒痛者絀急而惡寒戰慄氣虛痛者惡勞動其脉大血虛痛者善驚惕其脉芤頭痛白有多因而古方每用風藥何也高巔之上惟風可到味之薄者陰中之陽自地升天者也在風寒濕者固爲正用卽虛與熱者亦假引經須知新而暴者但名頭痛深而久者名爲頭風頭風必害眼者經所謂東風生於春病在肝目者肝之竅肝風動則邪害空竅也察內外之因分虛實之證胸中洞然則手到病去矣

風溼挾熱頭痛上壅損目及腦痛偏正頭痛年深不愈

並以清室膏主

之痛甚加細辛痰厥頭痛太陰脉緩

清室膏去羌活防風加半夏天麻

陽明頭痛發熱

惡熱而渴

白虎湯加白芷

腎厥頭痛卽經所謂下虛上實其脉舉之則

弦按之則堅

玉真丸來復丹

傷食頭痛胸滿噯酸噫敗卵臭惡食雖發

熱而身不痛

香砂木丸

傷酒頭痛

葛花解醒湯

怒氣膈肝

沉香降氣散蘇子降氣湯

頭痛九竅不利

屬氣虛

補中益氣湯加芍藥川芎細辛

眉尖後近髮際曰魚尾

魚尾上攻頭痛

屬血虛

四物湯加薄荷動作頭痛

胃熱也酒炒大黃五錢濃茶煎服

心煩頭痛

清室膏加麥門冬丹參

上熱

頭痛目赤下寒足筋為甚大便微

秘

既濟解毒湯

偏頭風

半邊頭痛

左為血虛右屬氣熱

草蘇子五錢去殼大棗十

五枚去核共搗研如泥塗綿紙上用筋一隻捲之去筋納鼻中

良久取下清涕即止

生蘿蔔汁仰臥注鼻中左痛注右右痛

注左

芎犀丸極效

雷頭風

頭痛而起核塊或頭中如雷鳴

震為雷震仰孟用青荷葉者象震之形

與色也

清震湯

有因痰火耳如雷鳴

熟半夏一兩大黃煨二兩天麻黃芩各六錢薄荷葉三錢

甘草三錢水泛菜豆大陰臥茶吞二錢痰利為度

頭頭痛

手足青至節旦發夕死夕發旦死

腦為髓海受邪則死灸百會穴猛進

大劑參附亦有生者

天頭痛

頭大如斗此天行時疫也

感天地非時之氣甚而潰裂出膿此邪客

上焦

普濟清毒飲子

輕者名發頭腫在兩耳前後

甘桔湯加薄荷荆芥鼠粘子連翹黃芩

肩稜骨痛外挾風寒內成鬱熱上攻頭腦下注目睛眉骨作痛

有屬心肝壅熱者有風痰上攻者有濕氣內鬱者選奇湯戴元

禮云眼眶痛有二證俱屬肝經肝虛見光則痛生熟地黃丸肝經停

飲痛不可開晝靜夜劇導痰湯

脈候寸口緊急或短或弦或浮皆頭痛 浮滑為風痰易治

短瀼為虛難治 浮弦為風 浮洪為火 細或緩為溼

少辛蔞恬菴頭痛如破昏重不甯風藥血藥痰藥久治無功余

曰尺微寸滑腎虛水泛為痰也地黃四錢山藥丹皮澤瀉各一

錢茯苓三錢沉香八分日服四貼兩日輒減六七更以七味丸人參湯送五日其痛若失

清空膏丹溪曰東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連者勿用太陽厥陰巔頂痛宜來復丹等亦非此藥所能治

羌活

防風各一兩

柴胡七錢

川芎五錢

甘草炙一兩半

黃連

炒一兩

黃芩

三兩一半生用一半酒炒

為細末每服三錢茶調如膏抹在口中少用白湯臨卧送下

白虎湯

見中暑

安神丸

治鬱熱頭痛

黃耆

羌活

黃蘗

酒炒各一兩

防風

二錢半

知母

酒炒

生地黃

酒潤

柴胡

升麻

各五分

炙甘草

三錢

生甘草

三錢

每服五錢水二鍾煎至鍾半加蔓荊子五分

川芎三分煎至一鍾臨卧熱服

透頂散

治新久偏正頭風及夾腦風

細辛

表白者二錢

瓜蒂

七個

丁香

三粒

糯米

七粒

冰片

麝香

各一分半

將冰麝研細將前味研勻另自治爲末後入乳鉢內與冰麝和勻磁瓶蜜固用一大豆許隨患人左右搐之久出涎則安

大川芎丸

治風寒痰飲偏正頭疼

川芎

一觔

天麻

四兩

爲末蜜丸每丸一錢

每服一九食後茶酒下

玉壺丸

治風痰吐逆頭痛目眩胸滿吐涎

南星

生

半夏

生各一兩

天麻

半兩

白麵

三兩

爲末水丸桐子大每服三十丸用水一碗先煎沸下藥煮候

藥浮卽熱漉起生薑湯下

玉眞丸

腎虛逆上頭痛謂之腎厥

硫黃二兩

石膏煨赤研

半夏湯洗

硝石研各一兩

爲末生薑汁丸桐子大陰乾每服二十九薑湯下炙關元百

壯寒甚者去石膏用鍾乳粉

來復丹

見中暑葛花解醒湯見泄瀉

沉香降氣散 治氣壅痞塞頭痛

沉香

二錢八分

砂仁

七錢五分

甘草

炙五錢五分

香附

鹽水炒去毛六兩二錢半

爲極細末每服二錢淡薑湯下

蘇子降氣湯

虛陽上攻氣不升降痰涎壅盛

蘇子

炒研

半夏

湯泡各二錢半

前胡

去蘆

甘草

炙

厚朴

黃製

陳皮

去白各一錢

當歸

去蘆一錢半

沉香

七分

水二鍾生薑三片煎一鍾服

虛寒者加桂五錢黃耆一錢

既濟解毒湯

治上熱頭目赤腫而痛煩悶不得安卧下體寒足胫尤甚大便微秘

大黃便通者勿用 黃連酒炒 黃芩酒炒 甘草炙 桔梗各二錢

柴胡 升麻 連翹 當歸身各錢

水二鍾煎一鍾食後服

神芎散 治風熱上攻頭痛鼻塞

青黛二錢五分 蔓荊子 川芎各一錢三分 鬱金 芒硝各一錢

石膏一錢三分 細辛根一錢 薄荷葉二錢 紅豆一粒 為細末搐鼻

茶調散 治風熱上攻頭目昏痛

黃芩酒浸炒二兩 川芎一兩 細茶三錢 白芷五錢 薄荷三錢

荊芥穗四錢 為細末每服三錢茶送下巔頂及腦痛加細辛葉本蔓荊子各三錢

菊花散 治風熱頭痛

甘菊花去蒂 旋覆花去梗 防風 枳殼去穢炒 羌活

蔓荊子 石膏 甘草炙各一錢五分

水二鍾薑五片煎一鍾服

芎藭丸

治偏正頭風鼻流臭涕服他藥不效者服此決效

川芎

殊砂水飛

石膏

片腦

各四兩

人參

茯苓

甘草炙

細辛

各一兩

犀角

梔子

各一兩

麥門冬

去心三兩阿膠兩半

為末蜜丸彈子大每服一丸

食後茶送

清震湯

治頭面疔瘡或聞雷聲

青荷葉

一個升麻錢四

蒼朮

泔浸四錢

水二鍾煎八分食後服

黑錫丹

治真頭痛

沉香

附子

胡蘆巴

肉桂

各五錢

茴香

破故紙

肉豆蔻

金鈴子

木香

各一兩

黑錫

硫黃

與黑錫結砂各一兩

為末研勻酒煮麵糊丸桐子大陰乾

每服五錢空心薑鹽湯送下

方有陽起石五錢巴戟一兩

晉濟消毒飲子

治大頭癰

腫甚者宜破刺之

黃芩

黃連

各八分

人參

五分

橘紅

玄參

甘草

生各四分

馬尾勃

牛旁子

板藍根

連翹

白殭蚕

炒

升麻

各一分

柴胡

桔梗

各五分

薄荷

六分

水二鍾煎一鍾服便秘加酒燂大黃一錢

選奇湯

治眉稜骨痛

防風

羌活

各三錢

黃芩

酒炒一錢

甘草

三錢夏生冬炙

每服三錢水煎熱服

生熟地黃丸

治肝虛頭痛目暗

生地黃

熟地黃

各一兩半

甘菊

去蒂一兩

石薺

防風

牛膝

各六兩

羌活

杏仁

各四兩

爲末蜜丸桐子大每服三錢以黑豆三升炒令烟盡淬好酒

六升每用半鍾食前送下

導痰湯 治痰飲頭痛

半夏

熟四兩

天南星

炮去皮

赤茯苓

去皮

枳實

炒

橘紅

各一兩

甘草

炙五錢

每服四錢水一鍾薑十片煎八分食後服

心腹諸痛

心痛

腹痛

胃脘痛

少腹痛

脇痛

經曰厥心痛與背相控善癢如從後觸其心僂僂者腎心痛也
腹脹胸滿心痛尤甚胃心痛也如以錐針刺其心心痛甚者脾
心痛也色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也卧若徒居心
痛間動作痛益甚色不變肺心痛也○陽明有餘土歸於心滑
則病心疝心痛引少腹滿上下無定處洩便難者取足厥陰心
痛腹脹嗌然大便不利取足太陰心痛知氣不足以息取手太
陰心痛引背不得息取足少陰

兩章論心痛凡十種皆他藏病干之而痛非本經自病也

愚按內經之論心痛未有不兼五藏爲病者獨詳於心而略於胸腹舉一以例其餘也心爲君主義不受邪受邪則本經自病名真心痛必死不治然經有云邪在心則病心痛喜悲時眩仆此言胞絡受邪在府不在藏也又云手少陰之脉動則病隘乾心痛渴而欲飲此言別絡受邪在絡不在經也其經與府之受邪皆因怵惕思慮傷神涸血是以受如持虛而方論復分九種曰飲曰食曰熱曰冷曰氣曰血曰悸曰蟲曰疰苟不能徧識病因將何以爲治耶胃屬濕土列處中焦爲水穀之海五藏六府十二經脉皆受氣於此壯者邪不能干弱者著而爲病徧熱徧寒水停食積皆與真氣相搏而痛肝木相乘爲賊邪腎寒厥逆爲微邪挾他藏而見證常與心痛相同但或滿或脹或嘔吐或不能食或吞酸或大便難或瀉利面浮而黃本病與客邪必參

經而見也胸痛卽膈痛其與心痛別者心痛在岐骨陷處胸痛則橫滿胸間也其與胃脘痛別者胃脘在心之下胸痛在心之上也經曰南風生於夏病在心俞在胸脇此以胸屬心也肝虛則胸痛引背脇肝實則胸痛不得轉側此又以胸屬肝也夫胸中實肺家之分野其言心者以心之脉從心系却上肺也其言肝者以肝之脉貫膈上注肺也脇痛舊從肝治不知肝固內舍肱脇何以異於心肺內舍膈脇哉若謂肝經所過而痛何以異於足少陽手心主所過而痛者哉若謂經脉挾邪而痛何以異於經筋所過而痛者哉故非審色按脉熟察各經氣變卒不能萬舉萬當也且左右肺肝氣血陰陽亦有不可盡拘而臨證者可無詳察耶復痛分爲三部臍以上痛者爲太陰脾當臍而痛者爲少陰腎少腹痛者爲厥陰肝及衝任大小腸每部各有五

賊之變七情之發六氣之害五運之邪至紛至博苟能辨氣血虛實內傷外感而為之調劑無不切中病情矣

心痛有停飲則惡心煩悶時吐黃水甚則搖之作水聲小胃丹或胃苓

湯食積則飽悶噎氣如敗卵得食輒甚香砂枳朮丸火痛忽增

忽減口渴便秘清中外受寒內食冷草豆虛寒者歸脾湯加氣

壅攻刺而痛沉香降死血脉必瀉飲下作呃手拈散甚者心痛

而煩發熱動悸此為虛傷妙香蟲痛而上白痲唇紅能食或食

後即痛或痛後即能食或口中沫出上半月蟲頭向上易治下

半月虫頭向下難治先以鷄肉汁或蜜糖飲之引蟲頭向上隨

服剪紅虻蟲螞心痛有休止或吐虻蟲虻動則惡心嘔吐烏梅

散黃鬼疰心痛昏憤妄言蘇合熱厥心痛金鈴寒厥心痛虎附

胃脘痛治法與心痛相倣但有食積按之滿痛者下之大柴虛

寒者

湯理中

胸痛

肝虛者痛引背

補肝湯

肝實者不得轉側喜太息

柴胡疏肝散

有痰

二陳湯加薑汁

脇痛

左痛多留血

代抵當湯

右痛多痰氣

痰二陳湯

左為肝邪

枳芎散

右為肝移邪於肺

推氣湯

挾寒

理中湯

死血

日輕夜重或午後熱

食積有一條扛起者是

也

枳朮丸

加吳茱萸

肝火盛

龍薈丸

虛冷

黑錫丹

驚傷

脇痛

散

桂枝

腹痛

芍藥甘草湯

主之

稼穡作甘甘者已也曲直作酸酸者甲也甲已

化土此仲景妙方也

脈緩傷水加桂枝生薑

脈洪傷金加黃芩

大棗

脈瀼傷血加當歸

脈弦傷氣加芍藥

綿痛而無增減欲得熱手按及喜熱飲食其脈遲者寒也

理中

湯

理中

湯

理中

湯

理中

湯

理中

湯

理中

湯

理中

湯冷痛用溫藥不效大便秘者當微利之霍香正氣散如時痛

時止熱手按而不散脉大而數者熱也大金花九或暑痛香薷

飲溼痛小便不利大便澹脉必細緩胃苓痰痛或眩暈或吐冷

涎或下白積或小便不利或得辛辣熱湯則暫止脉必滑輕

湯加枳殼薑汁重食積痛甚大便後減其脉弦或沉滑平胃散

者用礞石滾痰丸木酒積痛葛花解醒湯加氣滯必腹脹脉沉香

山查麥芽砂仁木酒積痛三稜義木茵陳氣滯必腹脹脉沉香

香甚者加大黃散死血作痛痛有定在而不移脉澀或芤虛者四物湯料加

散桃仁承氣湯或用丹皮香附穿山甲降香紅大黃蜜丸服實者

花蘇木玄胡索當歸尾桃仁加童便韭汁酒重痛心腹懊懣往

來上下痛有休止或有塊耕起腹熱善渴面色乍青乍白乍赤

吐清水者重也或雞汁吞萬應丸下之乾霍亂一名攪腸痧痼

痛內癰皆腹痛各詳具本門

愚再按近世治痛有以諸痛屬實痛無補法者有以通則不痛

醫云心賣 心腹痛 七

痛則不通者有以痛隨利減者互相傳授以爲不易之法不知形實病實便閉不通者乃爲相宜或形虛脈弱食少便泄者豈容混治經曰實實虛虛損不足而益有餘如此死者醫殺之耳須知痛而脹閉者多實不脹不閉者多虛拒按者爲實可按者爲虛喜寒者多實愛熱者多虛飽則甚者多實飢則甚者多虛脈實氣粗者多實脈虛氣少者多虛新病年壯者多實久痛年衰者多虛補而不效者多實攻而愈劇者多虛痛在經者脈多弦大痛在藏者脈多沉微必以望聞問切四者詳辨則虛實灼然實者固可通利虛者安可通利乎故表虛而痛者陽不足也非溫經不可裏虛而痛者陰不足也非養營不可上虛而痛者以脾傷也非補中不可下虛而痛者脾腎敗也非溫補命門不可亦泥痛無補法則殺人慘於利器矣

脉候弦爲痛爲食 濇爲痛 短數爲痛 大爲病久 痛甚
者脉必伏 細小沉遲者生 實大浮長滑數者死 大痛而
喘人中黑者死 寸口脉弦脇下拘急而痛其人惡寒

醫案

給諫章魯齋暑月自京口歸邑心中大痛吳門醫者令服香薷
飲痛勢轉增余曰寸口弦急痰食交結也服香砂二陳湯兩貼
痛雖畧減困苦煩悶更以胃苓湯加半夏二錢大黃三錢下黑
屎數枚痛減三四仍以前湯用大黃四錢下膠痰十數碗始安
孝廉李長蘅吳門舟次忽發胃脘痛用順氣化食之劑弗效余
診之曰脉沉而遲客寒犯胃也以參蘇飲加草豆蔻二錢煎就
加生薑自然汁半碗一服而減二服而瘥

縣令章生公在南都應試時八月初五心口痛甚至不能飲食

余診之寸口漈而軟與大劑歸脾湯加入參三錢官桂一錢生公云痛而驟補實所不敢得無與場期碍乎余曰第能信而服之可以無碍恐反投破氣之藥其礙也必矣遂服之不踰時而痛減更進一劑連飲獨參湯兩日而愈場事獲竣

太史焦漪園當臍切痛作氣食療之無功余診之曰當臍者少陰腎之部位也況脉沉而弱與氣食有何干涉非徒無益反害真元以八味丸料煎飲不十日而健復如常

京鄉胡慕東名忻少腹作痛連於兩脇服疎肝之劑目甚一日余

診之左關尺俱沉遲治以理中湯加吳茱萸一劑知十劑起矣加味七氣湯治七情鬱結心腹作痛

蓬朮

青皮

香附

醋炒各一錢半

玄胡索

一錢一錢黃一錢

草豆蔻

八分

三棱

炮七分

桂心

五分

益智仁

七分

陳皮

八分

藿香 七分

炙甘草 四分 水二鍾煎一鍾食前服死血加桃仁紅花

手拈散 治血滯心腹作痛

玄胡索 醋炙 五靈脂 醋炒 草果

沒藥 各等分

為細末每服三錢熱酒調下

桃仁承氣湯 見傷寒

小胃丹 見腫脹 胃苓湯 代抵當湯 見世行瘀

血 如血老而甚者去歸地加蓬朮

生地黃 當歸尾

穿山甲 各三錢 降香 一錢 肉桂 一錢 去皮

桃仁 去皮尖炒二錢

大黃 去皮三錢 芒硝 八分

水二鍾煎一鍾 血在上食後服血在下食前服

清中湯 治火痛

黃連

梔子 炒各二錢

陳皮

茯苓 各一錢半 熟半夏 一錢

草豆蔻

甘草 炙各七分

水二鍾煎三片煎八分食前服

草豆蔻丸 治客寒犯胃 心腹作痛熱者亦可服

草豆蔻一錢半 吳茱萸 益智仁 煨薑炒各八分 當歸身

青皮各六分 神麴 薑黃各四分 生甘草三分 桃仁七個

熟半夏一錢 澤瀉一錢 麥芽炒一錢 炙甘草六分 柴胡四分

人參 黃耆 陳皮各八分

為末水丸每服三錢食遠白湯下

大柴胡湯見傷寒

加味歸脾湯 治心虛悸動而痛

人參 黃耆炙 白木炒 當歸 茯苓

酸棗仁各一錢半 遠志肉八分 木香 甘草炙各五分 龍眼肉二錢

大棗二枚 煨薑三片 菖蒲八分 桂心五分

水二鍾煎一鍾食後服亦有加柴胡山梔者

沉香降氣散見頭二陳湯見虛理中湯見傷

妙香散治心氣不足恍惚虛煩盜汗不寐跳動不甯

山藥薑汁炒 茯苓去皮 茯神去皮 遠志去心炒 黃耆各一兩

人參 桔梗 甘草炙各五錢 木香錢半 辰砂另研

麝香一錢另研 為細末每服三錢或湯或酒調下

金鈴子散 治熱厥心痛或作或止

金鈴子 玄胡索各二兩 為末每服三錢酒調下痛止與香砂枳木丸

木附湯 治寒厥心痛脈微氣弱

附子炮一兩 白朮炒四兩 甘草炙一兩

為末每服三錢用水一鍾半薑五片棗二枚煎一鍾食前服

蕪荑散 虫咬心痛貫心則殺人宜亟服之

乾漆炒至烟盡一兩 蕪荑五分 雷丸五分 為末每服三錢溫水調服

烏梅丸

見傷寒

剪紅丸

見反胃

蘇合丸

見中風

補肝湯

山茱萸

甘草

桂心各三兩

桃仁

細辛

栝子仁

茯苓

防風各一兩

大棗二十枚

水九碗煎四碗分三服

柴胡疎肝散

柴胡

陳皮

醋炒各二錢

川芎

枳殼

炒

芍藥

各一錢半

甘草

炙五分

香附

一錢五分

水二鍾煎八分食前服

推氣散

治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃

枳殼

麩炒

桂心

忌火各五錢

甘草

炙二錢

爲細末每服三錢薑湯調下

枳芎散

治左脇刺痛

枳實

川芎各五錢

甘草錢二為末每服三錢薑湯下

導痰湯

治痰飲痞塞為痛

熟半夏

四兩

天南星炮去皮

枳實鹽炒去穢

赤茯苓

去皮橘紅各一兩

甘草

炙五錢

每服四錢水一碗薑十片煎八分食遠服

龍薈丸

當歸

龍胆草

梔子

黃連

黃柏

黃芩

各一兩

大黃

蘆薈

青黛

各五錢

木香

二錢五分

麝香

五分

細末蜜丸如菉豆大每服三錢生薑湯下

黑錫丹

見頭痛

葛花解醒湯

見酒瀉

桂枝散

驚氣傷肝脇中疼痛

枳殼二兩

桂枝三兩

細末每服二錢薑棗湯調下

芍藥甘草湯

一名戊巳湯

治腹痛如神

芍藥 四錢 甘草 二錢 水二杯煎一杯服 酸以收之

霍香正氣散 方見中風 十味香薷飲 見類中風

大金花丸 加梔子去大黃名黃連解毒湯又名梔子金花丸

黃連 黃芩 大黃 各等分

為末水丸每服白湯下二錢

木香順氣散 治氣滯腹痛

木香 香附 檳榔 青皮 醋炒 陳皮

厚朴 薑製 蒼朮 泔浸 枳殼 麩炒 砂仁 各一錢 甘草 炙五分

水二鍾薑三片煎一杯食前服

萬應丸 取重積如神

黑丑 取頭末 大黃 檳榔 各八兩 雷丸 醃煮 木香 各一兩

沉香 五錢

將黑丑大黃檳榔同爲末大皂角苦練皮各四兩煎湯泛爲丸
九葉豆大雷丸木香沉香爲衣每服三錢五更用砂糖水下
腰痛

內經云太陽所至爲腰痛足太陽膀胱之脉所過還出別下項
拔挾脊痛腰似折脾不可以曲是經虛則邪客之痛病生○又
矣邪者風熱濕燥寒皆能爲病大抵寒多而風熱少也○又
云腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣房室勞傷腎虛腰痛陽氣
愚按內經言太陽腰痛者外感六氣也言腎經腰痛者內傷房
慾也假令作強伎巧之官謹其閉蟄封藏之本則州都之地真
氣布護雖六氣苛毒弗之能害惟以欲竭其精以耗散其真則
腎藏虛傷膀胱之府安能獨足於是六氣乘虛侵犯太陽故分
別施治有寒溼有風熱有挫閃有瘀血有滯氣有痰積皆標也
腎虛其本也標急則從標本重則從本標本不失病無遁狀矣

寒感寒而痛其脉必緊腰間如水得熱則減得寒則增五積散去枯梗

加吳茱萸或薑附湯加肉桂杜仲外用摩腰膏兼寒濕者

五積散加蒼朮麻黃

溼傷溼如坐水中腎屬水久坐水溼或傷雨露兩水相得以致

腰痛身重脉緩天陰必發溼湯兼風濕者獨活寄生湯

風有風脉浮痛無常處牽引兩足五積散加防風全蠍或小續命湯杜仲薑汁

炒為末每服一錢酒送治腎氣腰痛兼治風冷或牛膝酒

熱脉洪數發渴便閉甘豆湯加續斷天麻

閃挫或跌撲損傷乳香趁痛散及黑神散調下不效必有惡血四物湯加

桃仁穿山甲勞役負重而痛十補湯下

瘀血脉濇轉動若錐刀之刺大便黑小便或黃或黑日輕夜重

調榮活絡飲或桃仁酒調黑神散

氣滯脉沉人參順氣散或烏藥順氣散加五加皮木香或用降香檀香沉香各三錢

三分煎湯空心服

痰積脉滑二陳湯加南星脉有力者二陳湯加太黃

腎虛腰肢痿弱脚膝酸軟脉或大或細按之無力痛亦攸攸隱

隱而不甚分寒熱二候脉細而軟力怯短氣小便清利腎氣丸

肝茸羊脉大而軟小便黃虛火炎六味丸丹溪云久腰痛必用

官桂開之方止

五積散見類中風小續命湯見中風

獨活寄生湯治腎虛受風受濕腰腿拘急筋骨攣痛行步艱難

獨活 桑寄生 杜仲炮去絲 牛膝 細辛

秦艽 茯苓 桂心 防風 芎藭

人參各一錢半 甘草 當歸 芍藥 地黃各一錢

水二鍾生薑五片煎八分食前服如無寄生續斷似之

牛膝酒

牛膝

川芎

羌活

地骨皮

五加皮

薏苡仁

甘草各一兩

海桐皮

二兩 生地黃

為粗末絹袋盛入好酒二斗浸二七日每服一杯日三四杯

腎著湯

治腎虛傷濕腰中如帶五千錢腰冷如坐水中不渴小便自利此證名為腎著

乾薑

炒

茯苓

甘草

白朮各二兩

每服四錢水一鍾煎七分空心溫服

滲漉湯

治寒淫所傷身體重著如坐水中小便赤澀大便澀泄

蒼朮

炒

白朮

炒

甘草

炙各二兩

茯苓

去皮

乾薑

炮各一兩

橘紅

丁香

各二錢半

每服四錢

水一鍾棗一枚薑三片煎七分服

摩腰膏

治老人腰痛女人白帶

附子尖

烏頭尖

南星

各三錢半

硃砂

雄黃

樟腦

丁香各錢半

乾薑

麝香五分

為細末蜜丸龍眼大每用一九生薑汁化開如厚粥火上烘
熱放掌上摩腰中候藥盡即烘綿衣裹緊腰熱如火用一九
甘豆湯 治風熱腰痛二便不通

黑豆二合

甘草二錢

水二鍾生薑七片煎服間服敗毒散

敗毒散 風熱證通用

羌活

獨活

前胡

柴胡

人參

茯苓

甘草炒

枳殼

桔梗

芎藭各等分

每服三錢生薑五片煎服

乳香趁痛散 治打墜腰痛加全蝎更妙脚氣痛用

虎脰骨

酒炙黃敗龜酒炙各二兩

麒麟竭

赤芍藥

當歸

自然銅

煅研白附子炮

沒藥

防風

辣桂

骨碎補炒

蒼耳子微炒

白芷各三兩

牛膝

天麻

檳榔

五加皮

羌活各一兩

爲末每服一錢酒調

黑神散

黑豆

炒去皮半升

熟地黄

酒浸

當歸

酒潤

肉桂

乾薑

炒黑

甘草

炙

芍藥

蒲黃

各四兩

爲細末每服二錢童便半鍾酒少許煎服

復元通氣散

治一切氣滯及閃挫腰痛

大茴香

炒

穿山甲

炒各二兩

玄胡索

白牽牛

炒

橘紅

甘草

炙各一兩

木香

忌火一兩五錢

爲細末每服二錢熱酒調下

十全大補湯

即十補湯見虛勞

青娥丸

治腎虛腰痛

補骨脂

四兩炒

杜仲

薑汁炒四兩

爲末胡桃肉三十個研熟蜜少許丸桐子大每服四錢酒送

橘核酒 治跌打損傷瘀血作痛

橘核炒去 研細末每服二錢酒調下

調榮活絡飲 治失力腰閃或跌撲瘀血

大黃 當歸 牛膝酒洗 杏仁去皮炒 赤芍藥

紅花 生地酒洗 羌活各一錢 川芎一錢 桂枝三分

水鍾半煎八分食前服

人參順氣散 治氣滯腰痛

白朮 白芷 陳皮 桔梗 枳殼

人參 甘草 川芎 麻黃去節 烏藥

白薑各一錢 水二鍾煎一鍾服

烏藥順氣散

白朮 茯苓 青皮 白芷 陳皮

烏藥

人參各一兩

甘草五錢

為未每服三錢水一鍾煎七分服

二陳湯

見中風

無比山藥丸

治腎虛腰痛

赤石脂

煨

茯神

去皮

山茱萸

去核

熟地黃

酒煮

巴戟

去心

牛膝

酒浸

澤瀉

各二兩

杜仲

薑汁炒

兔絲子

酒浸

山藥

各三兩

北五味

六兩

肉蓯蓉

酒浸

為末蜜丸

桐子大每服三錢酒下

六味丸

八味丸

見虛勞

補陰丸

龜板

酒炙

黃蘗

酒炒

知母

側柏葉

枸杞子

五味子

杜仲

薑汁炒

砂仁

各五錢

甘草

二兩

猪脊隨地黃膏為丸每服五錢淡鹽湯下

痛氣

內經曰任脉爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚牛脉起於中
毛際循腹裏上關元總諸陰之會故諸種疝證無不由任脉○
爲之原諸經爲之孤耳七疝詳列於後瘕聚者女子之疝也○
從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝便上衝心又不得大小
○肝所生病爲狐疝卧則入腹立則出腹入囊似狐之豈出穴
器上抵少腹者乃肝經之部分是受疝之處也狐疝也蓋環陰
證非肝木受邪即肝木自病此言狐疝乃肝經自病也○三陽
爲病發寒熱其傳爲癰疝三陽者手太陽小腸膀胱皆在太陽膀胱足
肝爲夫婦且支脉出氣街純毛除故也三陽皆能病○黃脉之至
疝也癰者頑痺不仁羣九腫大如升如斗者是也○黃脉之至
也大而虛積氣在腹中有厥氣名曰厥疝脾黃脉土脉也肝木乘
逆也言厥逆上升也肝部應春於象○脾傳之腎病名疝瘕少
爲木皆主上升怒則氣上於爲厥疝○脾傳之腎病名疝瘕少
腹冤熱而痛出白脾受所不勝之邪傳於所勝則脾失運化之
即方書所云狀如黃瓜者是也有氣不得申曰冤氣聚而痛白
精自出經曰寸口脉沉而弱疝瘕少腹痛又曰脉急者疝瘕少

腹痛○足陽明之筋病瘰癧筋急又曰肝脉滑甚爲瘰癧既曰
明病瘰癧又曰肝滑爲瘰癧則知此證肝○脾脉微大爲疝氣
木乘胃也瘰者累大膿血甚則下膿血也
滑甚爲瘰癧又曰腎脉滑甚爲瘰癧內裏膿血外小便閉名曰
愚按內經所謂任脉爲病內結七疝合言疝證之原也所謂衝
疝狐疝癰疝厥疝癰疝瘰癧疝瘰癧疝分言七疝之狀也巢氏不
能詳考內經原具七疝乃強分厥癰寒氣盤附狼自附於內經
之七疝不亦妄乎宜張子和非之曰此俗工所立謬名似矣及
其立論但辨陰器與小腸膀胱腎了不相干專屬肝經受病竟
不知任脉爲七疝之原亦不知經文自有七疝散見於各論之
中又添寒水筋血氣狐癰之七種此其疵謬與巢氏未有以異
也若言疝爲筋病皆挾肝邪則可若言止在厥陰一經不亦與
內經相戾耶且執病在下者引而竭之不問虛實概與攻下其

禍有不可勝言者豈待下後始補而可回其生平學者但當以內經爲正不當惑於多岐丹溪以爲疝證皆始於溼熱蓋大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝火鬱之久溼氣便盛濁液凝聚并入血隊流於厥陰肝性急速爲寒所束宜其痛甚此亦補前人未備之一端不可守爲揆度也故夫治法寒則多痛熱則多在血分者不移在氣分者多動蓋舉九有兩左九屬水水生肝木木生心火三部皆司血統納左之血者肝也右九屬火火生脾土土生肺金三部皆司氣統納右之氣者肺也是故諸寒收引則血泣而歸肝下注於左九諸氣憤鬱則濕聚而歸肺下注於右九且舉九所絡之筋非盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入絡也故患左九者痛多腫少患右九者痛少腫多此確然者耳

衝疝氣上冲心二便不通巢氏似治法木香散

狐疝卧則入腹立則出腹有狐疝仲景治狐疝時上時下者

散或用牡蠣六兩鹽泥固濟炭三觔煨至火盡取二兩乾薑一

兩焙為細末二味和勻水調得所塗疝處小便大利即愈

癰疽陰囊腫大如升如斗甚而如栲栲大者三層茴香九荔枝

子木腎不痛南星半夏黃柏蒼朮枳實山查白芷神效葉結

者晒乾為末酒糊丸鹽湯下用馬鞭草搗塗效張子和亦

厥疝脾受肝邪氣逆有積巢氏亦有厥疝肝邪甚者當歸四逆

散木香

瘰癧腫傳腎少腹熱痛出白即巢氏之瘰癧也丹溪所謂內鬱濕

熱者與此疝相似烏頭梗子湯或加丹溪云陽明受溼熱傳入

太陽發熱惡寒小腹悶痛等分同煎加生薑汁

瘕疝是陽明筋病內有膿血即巢氏之胎疝宜用桃仁玄胡索

瘕瘕疝內有膿血小便不通加味通心散或五

巢氏七疝厥厥逆心氣積滿心下寒寒飲食脇氣氣減而痛

作痛疝積者狼引小腹痛與陰相

子和七疝寒寒疝冷硬如石陰莖不舉或逆水

陰莖腫脹或潰膿或痛而裏急筋縮血滲

血莖中痛挺結不收白物隨溲而下

多氣則氣脹怒哭罷則氣散狐出入上下與狐相似也癰

痛不痒淫症也

小腸疝小腸之病小腹引辜左必連腰脊而痛小腸虛則風冷

乘間而入邪氣既入則厥而上冲肝肺控引辜丸上而不下香

練實吳茱萸陳皮馬蘭花醋炒各一兩莞花醋炒五錢醋糊丸

每服一錢加至三錢酒送又方益智蓬朮各五錢大茴山茶

黃牛膝續斷川芎蒴藿巴防風牽牛炒甘草各二錢半
為細末每服三錢水煎空心連滓服白湯調下亦得

膀胱氣小腹腫痛不得小便是也
五苓散一兩分三服葱白一
莖藿香一錢鹽八分水一鍾

煎七分服三服盡當下
便如墨汁續用礪砂丸

脉候弦急搏皆疝脉視在何部而知其藏
尺部脉滑為寒疝

東垣曰滑脉寸上見者為大熱陽與陽併也尺
部見滑為大寒丙丁不勝壬癸從寒水之化也

醫案

常州尹文輝嗜火酒能飲五觔五月間入閩中溪水驟漲涉水
至七里覺腹痛之甚半月後右丸腫大漸如斗形閩中醫者皆
與肝經之劑及溫熱之品半載無功歸而就商於余余曰嗜火
酒則溼熱滿中涉大水則濕寒外束今病在右正是脾肺之溼
下注羣丸以胃苓湯加梔子枳殼黃柏茴香十劑而羣減即以
為九服至十八觔全安經今十五年不再發

文學駱元賓十年患疝形容枯槁余脉之左脇有形其大如臂以熱手握之漉漉有聲甚至上攻於心問絕者久之以熱醋熏炙方甦余曰此經所謂厥疝用當歸四逆湯半月積形衰小更以八味丸間服喜其遵信余言半載無間積塊盡消後不復患木香散 治肝邪上厥痛悶欲絕

木香

陳皮

良薑

訶子

乾薑

枳實

各一錢半

草豆蔻

黑牽牛

川芎

各一錢

水二鍾煎一鍾空心服

蜘蛛散

仲景以之治狐疝

蜘蛛

十四枚微炒

桂

五分

右爲末每服一錢

雷公云蜘蛛勿用五色者身上有刺毛者

薄小者須用屋西南有網身小尻太腹內

有蒼黃膿者佳去頭足微炒研

醫宗必讀

卷八 疝

三

三層茴香丸 治一切疝如神 癰疽尤為要藥 第一料

大茴香 拌鹽五錢 炒和鹽秤 川棟子 去核 炒 沙參 木香 各一兩

右為細末 水煮米糊為丸 桐子大 每服三錢 空心鹽湯下 日

三服 纔完 便接第二料

照前方加 葦撥 一兩 檳榔 五錢

其前藥六味 重五兩半 為末 糊丸 服法如前 未愈服第三料

照前二方加 白茯苓 四兩 附子 製一兩

其前八味 重十兩 糊丸 服法同前 但每服三錢 雖三十年之

久大如栲栳者 皆可除根

荔枝散 治陰丸腫大痛不可忍

荔枝核 十四枚 燒灰 存性 用新者 沉香 大茴香 炒 木香

青鹽 各一錢 食鹽 各一錢 川棟肉 小茴香 各一錢

為末每服三錢空心熱酒調服

宣胞丸 治外腎腫痛

黑丑半生半熟

木通

青木香

盤螫七枚同炒

為末酒糊丸桐子大每服二錢鹽湯下

地黃膏子丸

治男婦奔豚氣塊小腹控擗而痛上冲心腹

人參

沉香

木香

白朮炒

玄胡索

血竭

蛤蚧

當歸

廣茂炮

吳茱萸

續斷

川芎

全蝎

茴香炒

川楝子麩炒

柴胡

沒藥

青皮

肉桂已上分兩無定數隨證加減用

右為細末地黃膏子丸如桐子大空心溫酒下二十九日加

一九至三十九

當歸四逆湯

當歸尾

七分

附子

炮

官桂

茴香

柴胡

各五分

芍藥

四分

玄胡索

川楝子

茯苓

各三分

澤瀉

二分

水二鍾煎一鍾空心服

川苦楝散

木香

川楝

巴豆拌炒去豆

茴香

鹽炒去鹽

等分爲末每服二錢空心食前酒調下

木香楝子散 疝氣久不愈者服此神效

石菖蒲

一兩炒

青木香

一兩炒

草薺

五錢

荔枝核

二十枚炒

川楝子

二十個炒

黃赤色去巴豆

二十枚同

爲細末每服二錢入麝香少許空心炒茴香鹽酒調下

烏頭梔子湯

治內有鬱熱外爲寒束

川烏頭

炮

梔子仁

炒各二錢

水二鍾煎一鍾空心服

加味通心散

治癰癰疔內有膿血小便不通

瞿麥穗

木通

去皮

梔子

去殼

黃芩

連翹

甘草

枳殼

去穢

川棟子

去核

歸尾

桃仁

去皮尖炒

山查

等分爲末每服三錢燈心車前草煎湯空心調服

五苓散

見傷寒

礪砂丸

木香

沉香

巴豆肉

各一兩

青皮

二兩

銅青

五錢研

礪砂

一錢研

二香青皮巴豆慢火炒紫色去巴豆爲末入礪砂銅青同研

勻蒸餅和丸桐子大每服七丸至十九鹽湯空心下日二服

羊肉湯

治寒痛腹痛裏急

當歸

二兩

生薑

五兩寒者加用

羊肉

一斤

水八碗煮取三碗溫服一碗一日飲盡

淋證

即癰證也小便不通謂之癰

內經曰脾受積溼之氣小便黃赤甚則淋

此言溼傳膀胱而成淋也上受溼侵積久

則鬱而為熱脾者主轉輸水

○風火鬱於上而熱其病淋此言

穀濕熱輸于膀胱證乃作○風火鬱於上而熱其病淋此言

膀胱而成淋也少陽甲胆為相火主風曰鬱於上

愚按內經言淋溼與熱兩端而已病源論謂膀胱與腎為表裏

但主水水人小腸與胞行於陰為溼便也若飲食不節喜怒不

時虛實不調藏府不和致腎虛而膀胱熱腎虛則小便數膀胱

熱則水下澁數而且瀉則淋瀝不宜小腹弦急痛引於臍分石

淋勞淋血淋氣淋膏淋冷淋六種石林者有如沙石膀胱蓄熱

而成正如湯瓶久在火中底結白碱也癆淋者因勞倦而成多

屬脾虛血淋者心主血心遺熱於小腸搏於血脉血入胞中與

洩俱下氣淋者肺主氣氣化不及州都胞中氣脹少腹滿堅溺有餘瀝膏淋者滴下肥液極類脂膏冷淋者寒客下焦水道不快先見寒戰然後成淋更有過服金石入房太甚敗精強閉流入胞中亦有溼痰日久注滲成淋由是則致淋之故殆有多端若不求其本末未有獲痊者也

石淋清其積熱滌去沙石則水道自利宜神效琥珀散如聖散獨聖散隨證選用

勞淋有脾勞腎勞之分多思多慮負重遠行應酬紛擾勞於脾

也宜補中益氣湯與五苓散分進專因思慮者歸脾湯若強力入

房或施泄無度勞於腎也宜生地黃丸腎虛而寒者金匱腎氣丸

血淋有血瘀血虛血冷血熱之分小腹硬滿莖中作痛欲死血

瘀也一味牛膝煎膏酒服大效但虛人能損胃耳宜四物湯加桃仁通草

紅花牛膝丹皮

血虛者

六味丸加側柏葉車前子白芍藥或入珍湯送益元散

血色鮮紅心與小

腸實熱脉必數而有力

柿蒂側柏黃連黃柏生地黃牡丹皮白芍藥木通澤瀉茯苓

血色黑

黯面色枯白尺脉澀遲下元虛冷也

金匱腎氣丸

或用漢椒根四五

錢水煎冷服然有內熱過極反兼水化而色黑者未可便以為

冷也須以脉證詳辨之

氣淋有虛實之分如氣滯不通臍下妨悶而痛者

沉香散石葦散瞿麥湯

氣虛者

八珍湯加杜仲牛膝茯苓

膏淋似淋非淋小便色如米泔或如鼻涕此精溺俱出精塞溺

道故欲出不快而痛

鹿角霜丸大沉香散沉香丸海金沙散菟絲子丸隨證選用

冷淋多是腎虛

肉蓯蓉丸澤瀉散金匱腎氣丸

胞痺膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣風寒濕邪氣

客於胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通小腹膀胱按之

內痛若沃以湯澁於小便以足太陽經其直行者上交額入絡
腦下灌鼻則爲清涕也

腎者湯腎湯
湯巴戟丸

脈候少陰脈數婦人則陰中生瘡男子則氣淋盛大而實者生
虛小而澁者死

醫案

邑宰嚴知非患淋經年痛如刀錐凡清火疎利之劑計三百帖
病勢日甚歲暮來就診余曰兩尺數而無力是虛火也從來醫
者皆泥痛無補法愈疎通則愈虛愈虛則虛火愈熾遂以八味
地黃丸料加車前沉香人參服八劑痛減一二而頻數猶故原
醫者進云淋證作痛定是實火若多溫補恐數日後必將悶絕
不可救矣知非疑懼復來商之余曰若不宜溫補則服藥後病
勢必增今既減矣復何疑乎朝服補中益氣湯晚服八味丸逾

月而病去其九更倍用參耆十四日而霍然矣

太司寇杜完三夫人淋瀝兩載靡藥不嘗卒無少效余診之見其兩尺沉數爲有瘀血停留法當攻下因在高年不敢輕投但於補養氣血之中加琥珀牛膝此等緩劑須以數十劑收功而夫人躁急求功再劑不效輒欲更端遂致痼疾

神效琥珀散 治水道澀痛頻下沙石

琥珀

桂心 去皮

滑石 水飛

大黃 微炒 葵子

膩粉

木通

木香

磁石 煨酒焙七次研

等分爲細末每服二錢燈心葱白煎湯調服

如聖散 治沙石淋

馬蘭花

麥門冬

去心

白茅根

車前子

甜葶藶

微炒

檀香

連翹

各等分

右爲末每服四錢水煎服如渴者加黃芩同煎入燒鹽少許服

獨聖散 治沙石淋

黃蜀葵花子俱用炒一兩

爲細末每服一錢食前米飲調服

補中益氣湯見虛勞

五苓散見傷寒

歸脾湯方見虛勞

金匱腎氣丸方見腰膝

生地黄丸 治腎虛勞淋

生地黄切焙

黃芪各一兩半

防風去皮

遠志去木

茯苓去木

石葦去毛

當歸焙各五錢

車前子

鹿茸去毛酥炙

黃芩去心

括婁各一兩

石葦去毛

當歸焙各五錢

車前子

赤芍藥

戎鹽研

蒲黃

甘草炙各七錢五分

車前子

滑石各二兩

人參錢一兩二分

爲末

蜜丸

梧子大每服二錢食前鹽湯下

黃耆湯

治腎虛勞淋

桑白皮七錢五分

人參

五味子

白茯苓

旱蓮子

黃耆湯

治腎虛勞淋

桑白皮七錢五分

人參

五味子

白茯苓

旱蓮子

磁石

煨醋

滑石

各一兩

黃耆

二兩

枳殼

麩炒

黃芩

各半兩

每服三錢水一鍾煎七分服

六味地黃丸

八珍湯

四物湯

俱見虛癆

沉香散

治氣淋臍下妨悶小便大痛

沉香

石葦

去毛

滑石

當歸

王不留行

瞿麥

各半兩

葵子

赤芍藥

白朮

各七錢半

甘草

炙二錢半

為末每服二錢大麥湯空心調服以利為度

石葦散

石葦

去毛

赤芍藥

各五錢

白茅根

木通

瞿麥

芒硝

葵子

木香

各一兩

滑石

二兩

每服四錢水一鍾煎六分服

瞿麥湯

瞿麥穗

黃連去蘖

大黃蒸

枳殼

當歸

羌活

去蘖

木通

牽牛

延胡索

桔梗

大腹皮

射干

各一兩半

桂心

去皮五錢

每服四錢水一鍾半生薑七片煎八分服

鹿角霜丸

鹿角霜

白茯苓

秋石

各等分

爲細末糊丸梧子大每服五錢米飲下

大沉香散 治膏淋臍下妨悶

沉香

陳皮

黃耆

各七錢半

瞿麥

三兩 榆白皮

韭子

炒

滑石

各一兩

黃芩

甘草

炙各五錢

爲末每服二錢食前米飲調服

沉香丸

沉香

肉蓯蓉

酒浸切焙

荆芥穗

磁石

煨醋煅七次

黃芪

滑石

各一兩

為末蜜丸梧子大每服三錢酒送

海金沙散

海金沙

滑石

各一兩

甘草

二錢五分

研末每服二錢燈心湯調送

兔絲子丸

兔絲子

酒蒸焙

桑螵蛸

炙各五錢

澤瀉

二錢五分

為末蜜丸梧子大每服二錢空心米飲下

肉蓯蓉丸

肉蓯蓉

酒蒸焙

熟地黃

酒煮切焙

山藥

炒黃

石斛

去根

牛膝

酒浸焙

官桂

去皮忌火

檳榔

各五錢

附子

炮去皮臍

黃芪

各一兩

黃連

去須七

細辛

去苗葉

甘草

炙各三錢五分

為末蜜丸梧子大每服二錢鹽酒下

澤瀉散

治冷淋脹滿澀痛

澤瀉

雞蘇

石葦

去毛炙

赤茯苓

蒲黃

當歸

琥珀

另研

檳榔

各一兩

枳殼

炒

桑螵蛸

炒各五錢

官桂

七錢五分

為細末每服二錢木通湯調服

腎著湯

見腰痛

腎瀝湯

見痺

巴戟丸

治胞痺

巴戟

去心一兩半

桑螵蛸

切破炒

杜仲

去皮炙

生地黄

附子

炮去

肉苁蓉

酒浸去甲

續斷

山藥

各一兩

遠志

去木三錢

石解

去根

鹿茸

炙

兔絲子

酒浸另搗

山茱萸

去核

北五味

龍骨

官桂

各七分半

為末蜜丸梧子大每服三錢空心陳酒送下

小便閉癰

經云肝足厥陰之脉過陰器所生病者閉癰又云督脉者女子

入繫廷孔

廷正也直也言正中

其孔溺孔之端也

女人溺孔在前陰半橫骨

之下也孔之上際謂之端乃督脉外起之所此雖以女子為言然男子溺孔亦在橫骨下中央但為宗筋所涵故不可見耳

其男子循莖下至纂與女子等此生病不得前後莖陰莖也便

俱閉也此雖督脉所生而竇亦衝任之病蓋又云三焦下膈在於

於足太陽之前少陽之後出於膈中外廉名曰委陽是足太陽

絡也三焦者足少陽太陰之所將太陽之別也上踝五寸別入

貫腸出於委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癰虛則

遺溺

此言三焦下膈之所行與所主之病也將領也三焦下膈

陽穴並太陽之正脉八絡膀胱又云膀胱不利為癰不約為遺

溺不約者不能約束收攝也

愚按閉與癰二證也新病爲溺閉蓋滴點難通也久病爲溺癰蓋屢出而短少也閉癰之病內經分肝與督脉三焦與膀胱四經然太陽膀胱但主藏溺其主出溺者皆肝經及督脉及三焦也又考膀胱爲州都之官津液藏焉氣化則能出矣夫主氣化者太陰肺經也若使肺燥不能生水則氣化不及州都法當清金潤肺車前紫菀麥門冬茯苓桑皮之類如脾濕不運而精不上升故肺不能生水法當燥脾健胃蒼朮白朮茯苓半夏之類如腎水燦熱膀胱不利法當滋腎滌熱黃柏知母茯苓澤瀉通草之類夫滋腎瀉膀胱名爲正治清金潤燥名爲隔二之治健胃燥脾名爲隔三之治又或有水液只滲大腸小腑因而燥竭宜以淡滲之品茯苓猪苓通草澤瀉之類分利而已或有氣滯不能通調水道下輸膀胱者順氣爲急枳殼木通橘紅之類有實熱者非與純陰之劑則陽無以化上焦熱者梔子黃芩中焦熱者黃連芍藥下焦熱者黃柏知母

有大虛者非與溫補之劑則水不能行

如金匱腎氣丸及補中益氣湯是也

如東

垣治一人小便不通目突腹脹皮膚欲裂服淡滲之藥無效東垣曰疾急矣非精思不能處思至夜半曰吾得之矣膀胱爲津液之府必氣化而能出服淡滲而病益甚是氣不化也無陽則陰無以生無陰則陽無以化淡滲氣薄皆陽藥也孤陽無陰欲化得乎以滋腎丸羣陰之劑授之卽愈丹溪嘗曰吾以吐法通小便譬如滴水之器上竅閉則下竅無以自通必上竅開而下竅之水出焉氣虛者補中益氣湯先服後吐血虛者芎歸湯先服後吐痰多者二陳湯先服後吐氣閉者香附木通探吐更有瘀血而小便閉者牛膝桃仁爲要藥別錄云小便不利審是氣虛獨參湯如神由是觀之則受病之源自非一途若不從望聞問切察之明審之當而浪投藥劑幾何不以人命爲戲耶

妊娠小便不通 孕婦胎滿壓胞多致小便閉塞宜升舉其氣

補中益氣 湯探吐 仲景用八味丸酒服 或令穩婆手入產戶托起其

胎溺出如注 或令孕婦眠于榻上將榻倒豎起胎即不壓而

溺出勝於手托多矣或各有所因者並依證施治

產後小便不通 陳皮去白為末空心酒調二錢外用鹽填臍

中卻以葱白皮十餘根作一縛切作一指厚安鹽上用大艾炷

滿葱餅上以火炙之覺熱氣入腹內即通 此唯氣壅者宜之若

者更當
審詳也

醫案

郡守王鏡如痰火喘嗽正甚時忽然小便不通自服車前木通
茯苓澤瀉等藥小腹脹悶點滴不通余曰右寸數大是金燥不
能生水之故惟用紫苑五錢麥門冬三錢北五味十粒人參二

錢一劑而小便湧出如泉若淡滲之藥愈多則反致燥急之苦不可不察也

先兄念山謫官浙江按察鬱怒之餘又當盛夏小便不通氣高而喘以自知醫服胃苓湯四貼不效余曰六脉見結此氣滯也但用枳殼八錢生薑五片急火煎服一劑稍通四劑霍然矣孝廉俞彥直修府志勞神忽然如喪神守小便不通余診之日寸微而尺鼓是水涸而神傷也用地黃知母各二錢人參丹參各三錢茯苓一錢五分黃柏一錢二劑稍減十劑而安八正散 治心經邪熱燥渴煩躁小便不通

瞿麥

蒲蓄

車前子

滑石

甘草炙

山枝仁

木通

大黃

麴蘖煨各等分

右爲末每服二錢水一鍾入燈心煎至七分食後臨卧服之

五苓散 方見
泄瀉

木通湯 治小便不通小腹脹甚

木通 滑石各五
牽牛取頭末
二錢半

右作一服水二鍾燈心十莖葱白一莖煎至一鍾食前服

通心飲 治心經有熱唇焦面赤小便不通

木通 連翹各三
水鍾半燈心十莖煎八分服

牛膝湯 治血結小便閉莖中痛

牛膝五錢 當歸三錢 黃芩二錢 水鍾半煎八分日三服

金匱腎氣丸 治腎虛小便不通或過服涼藥而愈甚者每服

三錢淡鹽湯送下 方見
腫脹

琥珀散 治老人虛人心氣閉塞小便不通

用琥珀為末每服一錢人參湯下極效

利氣散 治老人氣虛小便不通

黃耆

炙

陳皮 去白

甘草 各一錢

水一鍾煎七分服

參芪湯 治心虛客熱小便澀數

赤茯苓

一錢五分

生地黃

黃芪

桑螵蛸

微炙

地骨皮 各一錢

人參

五味子

克絲子

酒浸

甘草

各五分

水一鍾煎七分入燈心二十一莖一沸服

清肺散 治渴而小便閉澀

茯苓

二錢

猪苓

三錢

澤瀉

瞿麥

琥珀

各五分

燈心

一分

篇蓄

木通

各七分

通草

二分

車前子

一錢

水二碗煎至一碗

滋腎丸 治陰虛小便閉

黃檗

酒洗

知母

酒炒各二兩

肉桂

二錢

右爲末熟水爲丸如芡實大每服百丸加至二百丸百沸湯空心服

滋陰化氣湯 治因服熱藥小便不利臍下痛

黃連

炒

黃蘗

炒

甘草

各一錢半

水煎食前服未通加知母

滑石散 治男婦轉胞小腹急痛不得小便

寒水石

二兩

葵子

一合

滑石

亂髮灰 車前子

木通

去皮節各一兩

水十碗煎至五碗每服一碗一日服盡卽利

洗方 治胞轉小便閉先用

良薑

五錢

葱頭

二十枚

紫蘇

二兩

煎湯蜜室內薰洗小腹外腎肛門留湯再添醯綿洗以手撫

臍下拭乾 被中仰坐垂脚自舒其氣次用

蜀葵子

二錢

赤茯苓

赤芍藥

白芍藥

各五錢

每服三錢煎取清汁調蘇合丸三丸并研細青鹽五分食前溫服

又法 炒鹽半觔囊盛慰小腹

葱熨法 治小便閉小腸脹不急治殺人用葱白三觔切細炒

熟絹包分兩袋更替熨臍下即通

又法 以自爪甲燒灰水服

塗臍方 治小便不通

大蒜獨顆者一枚梔子七枚鹽花少許

右搗爛綿紙上貼臍良久即通末通塗陰囊上立通

又法 治小便閉垂死者神效

桃枝 柳枝 木通 白礬各一兩

葱白七個燈心一握

水三十碗煎十五碗用磁瓶熱盛一半藥汁薰外腎周廻以

被圍繞不令外風得人良久便通加赤豆汁若冷即易之效

小便黃赤

經云脉熱病者小便先黃又云胃氣盛則身已前皆熱消穀善

飢溺色黃又云肺氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變又

云冬脉不及令人眇清脊痛小便變上二段言肝胃有實熱下

者皆能令小便黃赤也厥陰之勝肱脇氣并化而為熱小便黃赤此運氣

也少陰司天熱淫所勝病溺色變又云少陽之勝溺赤善驚又

曰陽明司天燥氣下臨暴熱至陽氣鬱發小便變此皆運氣之

中氣不足溲便為之變此言

愚按小便黃赤人皆以下焦有熱清之利之而已矣甯知內經

藏府寒熱之別有如是耶故一切證候莫不有五藏六府之分

虛實寒熱之別苟不詳察其不禍人者幾希矣

火府丹 治心肝有熱小便黃赤

黃芩一錢五分 生地黃三錢 木通四錢 水二鍾煎一鍾時服

涼胃湯 脾胃有熱消穀善飢溺色黃赤

黃連一錢二分 甘草四錢 陳皮二錢 茯苓四錢

水二杯煎一杯食遠服

加味補中益氣湯 治脾肺虛小便黃赤

人參一錢 白朮一錢 黃耆一錢二分 甘草三分 當歸五分

陳皮六分 升麻三分 柴胡一分 茯苓二錢 車前子一錢

水二鍾煨薑三片棗一枚煎八分服

溫腎湯 治尺脉虛瀉足脛逆冷小便黃赤

附子製熟二錢 肉桂一錢 熟地二錢 茯苓一錢五分 牛膝一錢二分

水二杯煨薑五片煎一杯空心服 醫宗必讀卷之八終

宛委山莊刊重校醫宗必讀卷之九

雲間李中梓士材父著

門人董爾正季方父叅

姪孫李廷芳蘅伯父訂

大便不通

經曰北方黑色人通於腎開竅於二陰腎主五液津液盛則大傷胃氣及過於辛熱厚味則火邪伏於血中耗散其陰津液虧少故大便秘結又有年老氣虛津液不足而結者腎惡燥急食辛以潤之是也

愚按內經之言則知大便秘結專責之少陰一經證狀雖殊總

之津液枯乾一言以蔽之也分而言之則有胃實胃虛熱秘冷

秘風秘氣秘之分胃實而秘者善飲食小便赤麻仁丸七胃虛

而秘者不能飲食小便清利厚朴熱秘者面赤身熱六脉數實

腸胃脹悶時欲得冷或口舌生瘡四順清涼飲潤腸丸木秘

醫宗必讀 卷九 大便不通 一 宛委山莊

者面白或黑六脉沉遲小便清白喜熱惡冷桂枝湯正氣散加官

氣秘者氣不升降穀氣不行其人多噫蘇子降氣湯加枳殼香

九橫梅風秘者風搏肺藏傳於大腸竹小續命湯去附子倍芍藥加

九更有老年津液乾枯婦人產後亡血及發汗利小便病後血

氣未復皆能秘結法當補養氣血使津液生則自通誤用硝黃

利藥多致不救而巴豆牽牛其害更速八珍湯加蘇子廣橘紅

若病證雖屬陰寒而脉實微躁宜溫煖藥中畧加苦寒以去熱

躁躁止勿加如陰躁欲坐井中者兩尺按之必虛或沉細而遲

但煎理中湯待極冷方服或服藥不應不敢用峻猛之藥者宜

蜜煎導之川鹽五分皂角末五分冷秘者醫生薑導之或於蜜

頭末有熱者猪膽汁導之久虛者如常飲食法煮猪血臟湯加

酥食之血仍潤血臟仍潤臟此妙法也每見江湖方士輕用硝

黃者十傷四五輕用豆壯者十傷七八不可不謹也或久而愈結或變爲

肺接吐膿血或飲食不進而死

醫案

少宰蔣恬菴服五加皮酒遂患大便秘結四日以來腹中脹悶服大黃一錢通後復結余曰腎氣衰少津液不充誤行疏利是助其燥矣以六味丸煎成加入乳一鍾白蜜五錢二劑後即通十日而康復矣

文學顧以貞素有風疾大便秘結經年不愈始來求治余曰此名風秘治風須治血乃大法也用十全大補湯加秦艽麻仁杏仁防風煨皂角仁半月而效三月以後永不復患以手書謝曰不肯道力僻處窮鄉日與庸人爲伍一旦獲非常之疾困苦經年靡劑不嘗反深沉痼遂不遠百里就治神良作貽指教肺腑

快然及飲佳方如臭味之投百日以來沉痾頓釋今幸生歸矣
凡仰事俯育傳非意外之慶則傳非台翁之賜哉幸甚

麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴

去皮薄
汁浸炒

芍藥

枳實

數炒各
半觔

大黃

蒸焙
一觔

麻仁

別研
五兩

杏仁

去皮炒
五兩半

右爲末煉蜜和九桐子大每服二十九臨卧溫水下大便秘通
利卽止

七宣丸 治風氣結聚實邪秘結

桃仁

去皮尖
炒六兩

柴胡

訶子皮

枳實

數炒

木香

各五
兩

甘草

炙四
兩

大黃

麩裹煨
十五兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服二十九食前臨卧各一服米

飲下以利爲度

厚朴湯

治胃虛秘結

厚朴

薑汁浸炒透

陳皮

甘草

各三兩

白朮

五兩

半夏

麴

枳實

麴炒各二兩

右爲粗末每服五錢水一鍾半薑三片棗一枚

煎至八分食前大溫服

四順清涼飲

治血燥內熱大便不通

大黃

蒸

甘草

炙

當歸

酒洗

芍藥

各一錢

水鍾半薄荷十葉煎至七分服

潤腸丸

治風結血秘胃中伏火

羌活

歸尾

大黃

煨各五錢

桃仁

去皮尖

麻仁

各一兩

右爲末除麻仁桃仁另研如泥外爲紐末煉蜜丸如桐子大

每服五十九空心白湯送下

木香檳榔丸

疎導三焦快氣化痰消食寬中

木香

檳榔

枳殼

麴炒

杏仁

去皮尖炒

青皮

去穢各二兩

半夏麴

皂角酥炙

郁季仁各二兩

右爲末別以皂角四兩用漿水一碗搓揉熬膏更入熟蜜少許和丸桐子大每服五十九食後薑湯下

大承氣湯

大黃

芒硝

厚朴去皮

枳實各二錢

水二鍾生薑三片煎至九分內硝煎服

藿香正氣散

小續命湯

養正丹

八珍湯

俱見中風

蘇子降氣湯

治氣滯妨悶痰盛便秘

蘇子炒

半夏湯泡各二錢半前胡

甘草炙

厚朴

薑汁浸炒

陳皮各一錢

當歸一錢五分

沉香七分

水二鍾薑三片煎一鍾服虛人加桂五分黃耆一錢

半硫丸

治老人虛人冷秘

熟半夏為細末 硫黃研極細用酒

以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入帕內杵數百下
九如桐子大每服十五丸至二十九丸溫酒或薑湯下婦人醋
湯下俱空心服

橘杏湯 治脉浮氣秘若脉沉為血秘

杏仁湯泡去皮尖炒黃五錢 橘紅去白淨水一 鍾生薑三片煎七分服

益血潤腸丸

熟地黃六兩 杏仁去皮尖炒 麻仁各三兩以上 枳殼炒

橘紅各二兩五錢 阿膠炒 肉苁蓉各一兩半 蘇子 荆芥各一兩

當歸三兩 為末以前三味膏同杵千餘下仍加煉蜜丸桐

子大每服六十九丸空心白湯下

穿結藥 治大實大滿心胸高起便秘

穿結藥 治大實大滿心胸高起便秘

蟾酥

輕粉

麝香各一錢

巴豆五分
另研

研極細末用孩兒茶乳汁和丸如黍米大每服三丸薑湯下

小便不禁

經曰督脉生病為遺溺又曰肝所生病為遺溺督與肝二經並病則營衛不至氣血失常莫能約束水道之液故遺失不禁又曰膀胱不約為遺溺又曰手太陰之別名曰列缺其病虛則欠欬小便遺數由此二節觀之延孔而已三焦為決瀆之官失其常則遺溺何也三焦之脉從缺盆布膈中下鬲循臍三焦膀胱之脉從臍內挾脊抵腰中入循腎屬膀胱凡二焦虛則膀胱亦虛故不約也肺從上焦通調水道下輸膀胱而腎又上連於肺兩藏為子母母虛子亦虛此言上中下三焦氣虛皆可以致遺溺也

愚按世俗之治小便不禁者但知補澀而已不知內經論肝腎膀胱之病不指為何邪所干則知七情六氣皆能為病也又言手太陰虛者為子母相關之病則知所生所勝所不勝之五邪

皆足以爲病也總其大要而言肺者主氣以下降生水以下輸
膀胱者津液藏焉氣化則能出水泉不止者膀胱不藏也此兩
經者實爲總司肺虛者爲上虛當補氣補中益氣湯不愈當以
黃蘗生地麥門冬補其
熱膀胱虛者爲下虛當瀉脫桑螵蛸雞肫脫之類挾寒者家韭
子丸固脬丸白茯苓散兎絲子散
之類滑脫者牡蠣丸挾熱者白薇散或雞腸散更有睡則遺尿皆責之虛所以嬰兒脬
氣未固人下元不足多有此證在嬰兒挾熱者十居七八在
老人挾者十居七八此又不可不辨也
須審寒而宜大兎絲子丸猪脬
炙研碎煎湯送下更
爲之活

姪娘尿出不知用白礬牡蠣爲末酒調服二錢或鷄毛灰末酒
服一七或炙桑螵蛸益智仁爲末米飲下薛立齋云此證若脬
中有熱加味逍遙散若脾肺氣虛補中益氣湯加益智若肝腎
陰虛六味丸

產後小便不禁此氣血虛不能制故也薛立齋云若因穩婆損胞者八珍湯兼進補脾飲若膀胱氣虛而小便頻數當補脾肺若膀胱陰虛者須補肺腎

醫案

方伯張七澤夫人患飲食不進小便不禁余曰六脉沉遲水泉不藏是無火也投以八味丸料兼進六君子加益智肉桂二劑減數劑而安

文學俞玄倩憂憤經旬忽然小便不禁醫皆以固脾補腎之劑投之凡一月而轉甚余謂之曰六脉舉之則軟按之則堅此腎肝之陰有伏熱也用牡丹皮白茯苓各二錢苦參八分甘草稍六分黃連一錢煎成調黃雞腸與服六劑而安矣適有吳門醫者云既愈當大補之數日後仍復不禁再來求治余曰肝家素

有鬱熱得溫補而轉熾遂以龍胆瀉肝湯加黃雞腸服之四劑即止更以四君子加黃連山梔一月而愈

家韭子九 治遺溺夢遺白濁

家韭子

炒六兩

鹿茸

酥炙四兩

肉蓯蓉

酒浸去甲

牛膝

酒浸

熟地黃

當歸

各二兩

兔絲子

酒浸

巴戟

各一兩五錢

杜仲

炒

石薺

去苗

桂心

乾薑

各一兩

右爲末酒糊丸桐子大每服五十九丸加至百丸空心食前鹽湯溫酒送下

固脬丸

兔絲子

製二兩

茴香

一兩

附子

泡去皮臍

桑螵蛸

炙各五錢

戎鹽

二錢五分

右爲細末酒糊丸梧子大每服三十九丸空心米飲送下

白茯苓散

小便不禁

白茯苓

龍骨

乾薑炮

附子

炮去皮

續斷

桂心

甘草

炙各一兩

熟地黄

桑螵蛸

微炒各二兩

右剉碎每服四錢水一盞煎六分食前服

鹿茸散

治小便不禁陰痿腳弱

鹿茸

二兩去毛酥炙

韭子

微炒

羊躑躅

酒拌炒乾

附子

炮

澤瀉

桂心

各一兩

爲細末每服二錢食前粥飲調服

兔絲子散

治小便不禁或過多

兔絲子

二兩酒浸三日曬乾另搗爲細末

牡蠣

各二兩

附子

炮去皮臍

五味子

各二兩

雞臙

去黃皮微炒

肉蓯蓉

各二兩

右爲末每服二錢粥湯送下

牡蠣丸

牡蠣

白者三兩入礞殼鹽泥固濟炭伍斤煨半日取出研細

赤石脂

三兩搗碎醋拌勻溼於生鉄鉢內慢

火炒令乾二酒糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下味各研如粉

白薇散

白薇

白欬

白芍藥

各等分

右爲末每服二錢粥飲下

雞腸散

黃雞腸

雄者四具切破洗淨炙令黃

黃連

去鬚

肉蓯蓉

酒洗切焙

赤石脂

另研

白石脂

另研

苦參

各五兩

右爲末每服二錢食前酒下日二夜一

大兔絲子丸

治腎虛小便不禁

兔絲子

淨洗酒浸

澤瀉

鹿茸

去毛酥炙

石龍芮

去土

肉桂皮

去粗

附子

炮去皮各一兩

石薺

去根

熟地黃

白茯苓

去皮

牛膝

酒浸一宿焙乾

續斷

山茱萸

去核

肉蓯蓉

酒浸切焙

防風

去蘆

杜仲

去粗皮妙去絲

補骨脂

去衣酒炒

華澄茄

沉香

巴戟去心

茴香炒各三兩

五味子

桑螵蛸酒浸炒

覆盆子去枝葉萼 芎藭各半兩

右爲細末酒煮麵糊丸如桐子大每服二十丸空心溫酒或

鹽湯任下

逍遙散 治血虛小便不禁

白茯苓

白朮土炒

當歸身

白芍藥酒炒

柴胡各一錢

甘草五分

水一鍾煨薑三片煎至六分服

補中益氣湯

八珍湯

六味丸俱見虛癆

補脾飲 治產時傷脾小便漏出

生黃絲絹

一尺剪碎 白牡丹根皮用干葉者 白芨各一錢

右爲末水一碗煮至絹爛如餲空心頓服服時不得作聲作

聲卽不效

桑螵蛸散 治陽氣虛弱小便不禁

桑螵蛸 三十箇炒

鹿茸 酥炙

黃耆 各三兩

牡蠣 煨

人參

赤石脂

各二兩

右為末每服二錢空心粥飲調服

遺精

夢與女人交為遺不固夢而自遺者為精滑

經曰怵惕思慮者則傷神神傷則恐懼流淫而不止 怵恐也惕驚也流淫

謂流出淫精也思慮而兼之以怵惕則神傷而心怯心怯則

恐懼而傷腎腎傷則精不固此心腎不交故不能收攝也又

曰恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下 即上文之意而申言之

之也又曰五藏主藏精者也傷則失守 此言五藏各主藏精非腎

有所傷則失其藏精之職而不能自守又曰腎者主水受五臟六

腑之精而藏之 食氣入胃散精於五藏又水飲自脾肺而輸之

後天曰生之精與先天生來之精互化生成又曰厥氣客於陰

器則夢接內

陰器者宗筋之所繫也足太陰陽明少陰厥陰

筋皆結聚於陰器與衝任督三脉之所會然厥陰

遺精

八

主筋故諸筋皆統屬於厥陰也腎爲陰主藏精肝爲陽主疏泄陰氣乃泄精之竅是故腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固若遇陰邪客於其竅與相火強陽相感則夢寐之間精氣漏泄矣

愚按古今方論皆以遺精爲腎氣衰弱之病若與他藏不相干涉不知內經言五藏六府各有精腎則受而藏之以不夢而自遺者心腎之傷居多夢而後遺者相火之強爲害若乎五臟各得其職則精藏而治苟一藏不得其正甚則必害心腎之主精者焉治之之法獨因腎病而遺者治其腎由他藏而致者則他藏與腎兩治之如心病而遺者必血脉空虛本縱不收肺病而遺者必皮革毛焦喘急不利脾病而遺者色黃肉消四肢懈惰肝病而遺者色青而筋癢腎病而遺者色黑而髓空更當以六脉參詳昭然可辨然所因更自多端有用心過度心不攝腎而失精者宜遠志九佐以靈砂丹有色慾不遂而致精泄者四七湯吞白丸子甚者耳聞目

見其精即出名曰白濁 有色慾過度精厥虛滑 正元散加牡蠣粉肉蓯蓉各半

妙香散吞玉華白丹 錢吞靈砂丹仍佐以鹿茸丸山 有壯年久曠精滿而溢 清心有

藥九夫見絲子丸固陽丸之類 有壯年久曠精滿而溢 清心有

飲酒厚味痰火溼熱擾動精腑 升麻柴胡木半夏橘紅茯苓甘草 有

運則遺 有脾虛下陷者 補中益 有腎虛不固者 五倍子二兩茯苓

滑自止 然其證狀亦復不同或小便後出多不可禁者或小便

而自出或莖中疼痛常如欲小便者或夢女交者並從前法分

別施治或實有鬼魅相感其狀不欲見人如有對暗時獨言笑

時常悲泣脉息乍大乍小乍有乍無及脉來綿綿不知度數而

顏色不變乃其候也 宜硃砂雄黃麝香鬼箭虎頭更有久曠之

人或縱慾之人與女交合泄而不止謂之走陽其女須抱定勿

使陰莖出戶急呵熱氣於口中以指捻住尾閭即救矣若女人

驚而脫去者十有九死亟以童女接氣灌以大劑獨參湯亦有

活者總其大綱言之精滑宜澀之澀而不效卽瀉心火瀉而不效卽以補中益氣用升麻柴胡至一二錢舉其氣上而不下往往有功詎可補之不效澀之無靈遂委之命也哉

醫案

文學顧以功科試勞神南都歸卽患精滑小便後及夢寐間俱有遺失自服金櫻子膏經月不驗問治於余余曰氣虛而神動非遠志丸不可服十日而減半一月而全愈

武科張甯之稟質素強縱飲無度忽小便畢有白精數點自以爲有餘之疾不宜醫治經三月以來雖不小便時有精出覺頭目眩運醫者以固精澀脫之劑治療兩月畧不見功迎余治之但見六脉滑大此因酒味濕熱下於精藏遂以白朮茯苓橘紅甘草乾葛白蒺藜加黃柏少許兩劑後卽效不十日而康復如常

儒者錢用賓色慾過度夢遺精滑先服清相火之劑繼服固澀之劑皆無效來求余余以玉華白丹濃煎人參湯送二錢兩服後稍固兼進六味地黃丸加蓮鬚芡實遠志五味子丸一月愈遠志丸 治心腎不足夢遺精滑

茯神

去皮木

白茯苓

去皮膜

人參

龍齒

各一兩

遠志

去木薑汁浸

石菖蒲

各二兩

右爲末蜜丸桐子大辰砂爲衣每服三十丸空心熱鹽湯下

靈砂丹

治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜升降陰陽調和五臟補助元氣

水銀

一斤

硫黃

四兩

二味用新銚內炒成砂子入水火

鼎煨煉爲末糯米糊丸如麻子大每服三九空心棗湯米湯人參湯任下忌猪羊血菜豆粉冷滑之物

茯神湯

治慾心太熾夢遺心悸

茯神去皮木遠志去心酸棗仁炒各一錢二分石菖蒲人參

白茯苓各一錢黃連生地黃各入當歸酒洗一錢甘草四分

水二鍾蓮子七粒槌碎煎八分食前服

四七湯治七情鬱結痰氣妨則嘔吐惡心神情不快

半夏一錢五分茯苓去皮一錢二分紫蘇葉六分厚朴薑製九分

水一鍾薑七片紅棗二枚煎八分服

青州白丸子治風痰壅盛癱瘓嘔吐涎沫氣不舒暢悶悶不甯

半夏生七兩南星生二兩白附子生二兩川烏生半兩

右為末以生絹袋盛於井花水內揉出滓再研再揉以盡為

度置磁盆中日晒夜露至曉去舊水別用井水攪又晒至來

日早再換新水攪春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾

以糯米粉煎粥清丸菜豆大薑湯下二十九

妙香散 安心神閉精氣

龍骨

五色者

益智仁

人參

各一兩

白茯苓

去皮

遠志

茯神

去皮木

硃砂

水飛

甘草

炙各二錢半

右為末每服二錢空心溫酒調服

玉華白丹

清上質下助養本元最治二便不固夢遺精滑等證

鍾乳粉

煉成者一兩

白石脂

淨瓦上煨通紅研細

陽起石

磁礮中煨令通紅取出酒淬放

陰地上令乾各半兩

左顧牡蠣

泥七錢洗用

薤白者

取白者

右四味各研令極細拌和作一處研一二日以糯米粉煮糊

為丸如芡實大入地坑出火毒一宿每服一粒空心濃煎人

參湯待冷送下不潛不燥可以久服大補真元最祛宿疾婦

人無姪者當歸地黃浸酒送下凡服藥後以少少白粥壓之

忌猪羊血菜豆粉

正元散

治下元虛弱腹張痛泄利嘔吐陽虛
自汗夢遺精滑手足厥冷一切虛寒

紅豆

炒

乾薑

炮

陳皮

去白各三錢

茯苓

去皮

人參

白朮

甘草

炙各二兩

肉桂

去粗皮

川烏

炮去皮各半兩

附子

炮去皮尖

山藥

薑汁浸炒

川芎

烏藥

乾葛

各一兩

黃耆

炙一兩五錢

右爲細末每服三錢

水一盞薑三片棗二枚鹽少許煎七分食前溫服

鹿茸益精丸

治心腎虛冷漏精白濁

鹿茸

去毛酥炙

桑螵蛸

瓦上焙

肉蓯蓉

巴戟

去心

兔絲子

酒浸

杜仲

去皮薑汁炒

益智仁

禹餘糧

火煨醋淬

川楝子

去核焙

當歸

各三兩

韭子

微炒

補骨脂

炒

赤石脂

山茱萸

去核

龍骨

另研各五錢

滴乳香

二錢半

爲末酒煮糯米糊爲丸桐子大每服七十丸食前白茯苓煎湯送下

山藥丸

治諸虛百損夢失精滑

赤石脂

煨

茯苓

去皮

山茱萸

去核

熟地黃

酒浸

巴戟

去心

牛膝酒浸

澤瀉各一兩

杜仲去皮薑汁炒

兔絲子酒浸山藥各三兩

五味子六兩

肉蓯蓉酒浸四兩

右爲末蜜丸桐子大每服三錢鹽湯送下

大兔絲子丸見小便不禁

固陽丸

附子炮三兩

川烏頭炮三兩

白龍骨二兩

補骨脂

川棟子

舶上茴香各一兩七錢

右爲末酒糊丸桐子大每服五十丸空心酒下

補中益氣湯方見虛癆

蘇合香丸方見中風

秘真丸 固精安神

龍骨一分

訶子皮

五枚砂仁

五錢硃砂一兩水飛

右爲末麵糊丸菉豆大每服三錢空心酒下

金鎖玉關丸 治遺精白濁心虛不寐

雞頭肉

蓮子

蓮鬚

藕節

白茯苓

白茯苓

乾山藥

各等分

爲末金櫻子煎膏爲丸梧子大每服三錢米飲湯下

清心丸

治經絡熱夢遺心悸

黃蘗皮

一兩爲末

生腦子

一錢

同研勻蜜丸桐子大每服十九

加至十五丸濃煎麥門冬湯下

赤白濁

經曰思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發爲筋痿及爲白淫此已見遺精條矣茲復收者爲濁病仍在精廢以淋法治之五苓入正難投不已而病反增劇不知經論祇屬精病也

愚按經文及細考前哲諸論而知濁病卽精病非濁病也故患濁者莖中如刀割火灼而溺自清惟寢端時有穢物如瘡之膿如目之眵淋漓不斷與便溺絕不相混大抵由精敗而腐者十

之六七由溼熱流注與虛者十之二三其有赤白之分者何也
精者血之所化濁去太多精化不及赤未變白故成赤濁此虛
之甚也所以少年天癸未至強力行房所泄半精半血壯年施
泄無度亦多精血雜出則知丹溪以赤屬血白屬氣者未盡然
也又以赤爲心虛有熱由思慮而得白爲腎虛有寒因嗜欲而
得亦非確論總之心動於欲腎傷於色或強忍房事或多服淫
方敗精流溢乃爲白濁虛滑者血不及變乃爲赤濁挾寒則脉
來沉遲無力小便清白卑薛分清飲八味丸內補鹿茸丸之類挾熱則口渴便赤
脉必滑數有力清心蓮子飲香薷散有胃中溼痰流注蒼白二陳湯有屬
虛癆六味地黃丸加蓮鬚芩有因伏暑四苓散加香薷麥門冬人參石蓮肉之類有
稠粘如膠澁痛異常乃精塞竅道香薷散送八味丸或金匱腎
丸有思想太過心動煩擾則精敗下焦加味清心飲如上數端
瑞蓮丸之類

此其大畧若夫五臟之傷六淫之變難以枚舉臨症之頃慎之
脉候 脉大而濇按之無力或微細或沉緊而濇爲虛尺脉虛
浮急疾者皆難治遲者易治

醫案

歸德郡候李易齋患白濁服五苓散數劑無功余診之兩尺大
而濇是龍火虛炎精闕竅道用牛膝茯苓黃蘗麥門冬山藥遠
志細生甘草十劑而安

光祿卿吳伯玉閉精行房時有文字之勞患白濁莖中痛如刀
割自服清火疎利之劑不效改服補腎之劑又不效商治於余
余曰敗精久蓄已足爲害况勞心之餘水火不交坎離順用也
用萆薢分清飲加茯神遠志肉桂黃連四劑卽效兼服補中益
氣六味地黃丸半月而安後因勞復發但服補中益氣卽愈

清心蓮子飲

治心虛有熱小便赤濁

黃芩

麥門冬

去心

地骨皮

車前子

甘草

炙各一錢五分

石蓮肉

白茯苓

黃耆

蜜炙 人參各七分半

遠志

石菖蒲

各一錢

水二鍾煎一鍾空心溫服發熱加柴胡薄荷

葶藶分清飲

治真元不固赤白二濁

益智仁

川葶藶

石菖蒲

烏藥

各一錢

水一鍾入鹽一捻煎七分食前服

一方加茯苓甘草

蒼白二陳湯

治溼痰下注爲白濁

蒼朮

樛炒

白朮

土炒各一錢半

半夏

二錢 茯苓一錢二分

甘草

四分

水二鍾薑三片煎一鍾服

四苓散

茯苓

去皮

猪苓

去皮

白朮

土炒

澤瀉

各等分

右爲細末每服三錢空心長流水調服

玄菟丹

治三消渴利神藥禁止遺濁

兔絲子

酒浸通軟乘溼研

五味子

酒浸別爲末淨七兩

白茯苓

去皮

乾蓮肉

各三兩

右爲末別碾乾山藥末六兩將所浸酒添酒煮

糊搜丸如桐子大每服五十丸空心食前米飲下

六味地黃丸

八味地黃丸

補中益氣湯

見虛

金匱腎氣丸

見腫脹

內補鹿茸丸

補益精氣善止白淫

鹿茸

酥炙

兔絲子

酒浸

茯苓

炒

沙苑蒺藜

肉蓯蓉

紫菀

蛇床子

酒浸

黃耆

桑螵蛸

陽起石

附子

炮

官桂

各等分

右爲細末蜜九桐子大每服三十九食前溫酒送下

香苓散卽五苓散與辰砂妙香散合用

山藥薑汁炒 茯苓去皮

茯神去皮 遠志去心 黃耆各一兩

人參 桔梗去蘆

甘草炙各半兩 木香煨 辰砂三錢另研

麝香一錢另研 猪苓去皮

白朮土炒 澤瀉各八分 肉桂二錢

右爲末每服二錢天麥二冬去心煎湯空心調服日三服愈

茯朮丸治思慮太過心腎虛傷眞陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄

兔絲子酒浸五兩 石蓮子去殼 白茯苓去皮三兩

右爲細末酒糊丸如桐子大每服五十九空心鹽湯下

加味清心飲 治心中煩熱赤濁肥脂

白茯苓去皮 石蓮肉各一錢半 益智仁 麥門冬去心 人參去蘆

遠志去心 石菖蒲 車前子 白朮炒 澤瀉

甘草炙各一錢 水二鍾 燈心二十莖 煎一鍾 食前服有熱加薄荷少許

瑞蓮丸 治思慮傷心赤白二濁

白茯苓去皮 石蓮肉炒去心 龍骨生用 天門冬去心 麥門冬去心

栢子仁炒另研 紫石英火煨研細 遠志甘草水去心 當歸去蘆酒浸 酸棗仁炒

龍齒各一兩 乳香半兩另研 右為細末 蜜丸 梧子大 每服七十九丸 空心溫酒或棗湯下

遠志丸 治赤濁如神

遠志入兩去心 茯神去皮 益智仁各二兩

右為細末 酒煮麴糊丸 梧子大 每服五十九丸 臨臥棗湯下

鎖精丸 治赤白濁

補骨脂炒 青鹽各四兩 白茯苓 五倍子各二兩

右為細末 酒煮糊為丸 如梧子大 每服三十九丸 空心鹽湯下

水陸二仙丹 治赤白濁

金櫻子

去子及毛淨熬熟慢火熬成膏

芡實肉

研爲細粉各等分

右以前膏同酒糊爲丸梧子大

每服三十九食前溫酒下一方用乳甘九鹽湯下

赤脚道人龍骨丸 治白濁

龍骨

牡蠣

各半兩

右研爲末入鯽魚腹內溼紙裹入火內炮熟取出去紙將藥同魚肉丸如桐子大每服三十九空心米飲下鯽魚不拘大小只以着盡上件藥爲度更加茯苓遠志各半兩尤佳

痰飲

稠濁者爲痰清稀者爲飲

經曰太陰在泉溼淫所勝民病飲積又曰歲土太過雨溼流行甚則飲發又土鬱之發太陰之復皆病飲發

按痰之爲病十嘗六七而內經敘痰飲四條皆因溼土爲害故先哲云脾爲生痰之源又曰治痰不理脾胃非其治也夫飲入

於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸
膀胱水精四布五經並行何痰之有惟脾土虛溼清者難升濁
者難降留中滯高痰而成痰故治痰先補脾脾復健運之常而
痰自化矣拆而言之痰有五飲亦有五而治法因之而變在脾
經者名曰溼痰脉緩面黃肢體沉重嗜卧不收腹脹食滯其痰
滑而易出二陳湯白朮九挾虛者六君子湯酒傷者白蘗乾葛挾食者保和九挾暑者消暑九驚者妙應九在
肺經者名曰燥痰又名氣痰脉澁面白氣上喘促洒淅寒熱悲愁不
樂其痰澀而難出利金湯在肝經者名曰風痰脉弦面青四肢
滿悶便溺秘澁時有躁怒其痰青而多泡水煮金花九防風九川芎九在心
經者名曰熱痰脉洪面赤煩熱心痛口乾唇燥時多喜笑其痰
堅而成塊小黃九大黃湯在腎經者名曰寒痰脉沉而黑小便急痛足
寒而逆心多恐怖其痰有黑點而多稀薑桂九八味九胡椒理中九其人素

盛今瘦水走腸間輾轉有聲名曰痰飲心下冷極以溫藥和之

桂苓甘水湯主之

飲後水流在脇下咳吐引痛名曰懸飲十棗湯下之飲水

流於四肢當汗不汗身體疼重名曰溢飲大青龍湯汗之欬逆倚息短

氣不得卧其形如腫名曰支飲

五苓散澤瀉湯利之

膈滿嘔吐喘欬寒熱

腰背痛目淚出其人振振惡寒身瞢惕者名曰伏飲

依本九更有

一種非痰非飲時吐白沫不其稠粘此脾虛不能約束津液故

涎沫自出宜用六君子湯加益智仁以攝之嗟乎五痰五飲證

各不同治法迥別稍或不詳妄投藥劑非徒無益而又害之至

如脾肺二家之痰尤不可混脾爲溼土喜溫燥而惡寒潤故二

朮星夏爲要藥肺爲燥金喜涼潤而惡溫燥故二母二冬地黃

桔梗爲要藥二者易治鮮不危困每見世俗惡半夏之燥喜貝

母之潤一見有痰便以貝母投之若是脾痰則土氣益傷飲食

忽減矣即使肺痰毋過於涼潤以傷中州稍用脾藥以生肺金方爲善治故曰治痰不理脾胃非其治也信夫

脉候

經曰肝脉裏而散色澤者當病溢飲 偏弦爲飲浮而

滑爲飲

沉而滑者懸飲

飲脉皆弦微沉滑

左右關脉實

者膈上有痰可吐之

眼胞及眼下如烟煤者痰也

痰得瀉

脉難愈

醫案

刑部主政徐凌如勞且怒後神氣皆倦汗出如浴語言錯亂危困之極迎余療之診其脉大而滑且軟此氣虛有痰也用補中益氣湯料併四貼爲一劑用參至一兩加熱附子一錢熟半夏三錢四日而稍甦更以六君子加薑汁一鍾服數日兼進八味丸調理兩月而康

郡侯王敬如患痰嗽極服清氣化痰丸漸至氣促不能食余曰
高年脾土不足故有是證若服前丸則脾土益虛矣投以六君
子湯加煨薑三錢益智一錢五分十劑而痰清更以前方煉蜜
爲丸約服一觔飲食乃進

翰林李集虛勞而無度醉而使內汗出多痰服寬膈化痰之藥
轉覺滯悶診其脉沉而濡兩尺尤甚余謂其婿楊玄潤曰痰得
濡脉一時難愈況尺中濡甚精傷之象也在法不治立潤強之
投劑勉用補中益氣加半夏茯苓兩劑有小效衆皆喜余曰濡
象不減脉法無根死期近矣果十餘日而歿

文學朱文哉遍體如虫蟄口舌糜爛朝起必見二鬼執盤盂以
獻向余慟曰余年未三十高堂有垂白之親二鬼旦暮相侵決
無生理尚邀如天之力得以不死卽今日之秦越人矣余診其

寸脉乍大乍小意其爲鬼祟細察兩關弦滑且大遂斷定爲痰
飲之病投滾痰丸三錢雖微有所下而病患如舊更以小胃丹
二錢與之復下痰積及水十餘碗遍體之痛減半至明早鬼亦
不見矣更以人參三錢白朮二錢煎湯服小胃丹三錢大瀉十
餘行約有二十碗病若失矣乃以六君子爲丸服四觔而痊
白朮丸 治溼痰咳嗽

南星

半夏

各一兩
俱湯洗白朮

一兩
五錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸梧子大每服四錢食後生薑湯下
二陳湯 治脾胃不和一切痰證

半夏

湯洗
七次

橘紅

各五
兩

白茯苓

三兩

炙甘草

一兩
五錢

每服五錢水二鍾薑七片烏梅一枚煎八分不拘時熱服
六君子湯

人參去蘆

白朮土炒

茯苓各一錢

半夏

橘紅各一錢五分

炙甘草五分

水二鍾薑五片煎至一鍾溫服

理中化痰丸 治虛寒嘔吐泄瀉飲食難化

人參

白朮炒

茯苓

甘草

乾薑

半夏薑製

等分為末水丸桐子大每服三錢白湯送下

八味丸 補中益氣湯方見虛勞

導痰湯 治痰涎壅盛痞塞不通

半夏

湯洗七次四兩

南星炮去皮

枳實

去瓤炒

赤茯苓

去皮橘紅各兩

甘草

炙半兩

每服四錢水一鍾薑十片煎八分食後服

保和丸 治食積酒積

山楂肉

二兩

半夏

薑製

橘紅

神麴

炒

麥芽

白茯苓

各一兩

連翹

萊菔子

炒

黃連

各半兩

右為永滴水為丸加白朮二兩名大安丸

消暑丸

中暑為患藥下即愈一切暑藥皆不及此人所未知

半夏

一斤醋五碗煮乾

甘草

生用

茯苓

去皮各半兩

右為末薑汁煮糊丸忌見生水如桐子大每服五十丸熱湯送下有痰生薑湯下入夏後不可缺此

妙應丸

一名控涎丹

甘遂

去心

紫大戟

去皮

白芥子

各等分

右為末煮糊丸如桐子大晒乾臨臥淡薑湯下七丸至十丸

氣實痰猛加丸數不妨加硃砂二錢全蝎三錢治驚痰及效

利金湯

新製

治氣壅之痰

桔梗

炒

貝母

薑汁炒

陳皮

去白

茯苓

二錢

甘草

五分

枳殼

錢五分

水二鍾薑五片煎一鍾不拘時服

潤肺飲新製

貝母糯米拌炒

天花粉各三錢 桔梗一錢

甘草五分 麥門冬去心

橘紅去白

茯苓去皮各一錢半 知母酒炒七分

生地黄二錢半

水二鍾薑三片煎七分食後服

水煮金花九

南星

半夏各一兩 天麻五錢

雄黃二錢 白麵三兩

右爲細末滴水爲丸每服五十九至百九先煎漿水合沸下藥煮至藥浮爲度瀉出淡漿水浸另用生薑湯送下

防風九 治一切風痰

硃砂半兩研

天麻酒浸二宿 甘草炙

防風 川芎各一兩

右爲末煉蜜丸硃砂爲衣每服一丸重一錢荆芥湯化服

川芎九 消風化痰清上利膈

薄荷葉

焙

川芎

各七兩半

桔梗

十兩

甘草

炙三兩半

細辛

洗五錢

防風

去苗二兩半

爲細末

煉蜜丸

每服

一九

重三分

食後臨臥

細茶下

小黃丸

治熱痰咳嗽

南星

湯洗

半夏

湯洗

黃芩

各一兩

爲末

薑汁浸

蒸餅爲丸

桐子大

每服

七十九丸

食後生薑湯下

天黃湯

天花粉

十兩

黃連

十兩

竹葉湯爲丸

菴豆大

每服

三錢

薑湯下

薑桂丸

治寒痰咳嗽

南星

洗

半夏

洗

官桂

去麋皮

右爲末

蒸餅丸

桐子大

每服

五十九丸

食後生薑湯下

胡椒理中丸

治虛寒痰多食少

款冬花

去梗

胡椒

甘草炙

鹽撥

良薑

細辛 去苗

陳皮去白

乾薑各四兩

白朮五兩

爲末蜜丸梧子大每服三十丸加至五十丸米飲下日二服

桂苓朮甘湯

茯苓 四錢

桂枝

白朮錢各三

甘草二錢

水二鍾煎
一鍾溫服

十棗湯

寒月傷

小胃丹

神芎導水丸

舟車神佑丸

大聖濟川散

腫俱
脹見

五苓散

寒見傷

青州白丸子

見遺精

大青龍湯

麻黃

六、大錢節

桂枝

二錢皮

甘草

錢災二

杏仁

一錢 去皮

生薑

三錢

大棗

去二核校

石膏

一錢

水三鍾先煮麻黃減一鍾去上沫內諸藥煮取一鍾服

澤瀉湯

澤瀉

二兩半

白米

一
一
一

水二鍾煎一鍾服

倍朮丸 治五飲

白朮 三兩

桂心

乾薑 各一兩

右爲末蜜丸每服三十丸米飲下

滾痰丸 治一切痰百種惟證

大黃

蒸少頃不可過 黃芩 各八兩

青礞石 硝煨 沉香

百藥 錢各五

右爲末水丸梧子大白湯空心服三錢此藥但取痰積自腸

次第而下並不刮腸大瀉爲痰家聖藥

茯苓丸

治痰滿膈間兩臂抽痛如神

半夏 二兩

茯苓 一兩

枳殼

去瓢炒五錢

朴硝

二錢五分以硝散在竹盤中少

時盛水置當風處卽乾加芒硝刮取用

右爲末生薑汁煮麵糊爲丸桐子大每服三十丸薑湯送下

清氣化痰丸 順氣消食化痰

半夏

南星去少

白礬

皂角

乾薑各四兩

右先將白礬等三味用水五碗煎三碗却入半夏南星浸兩

日再煮至半夏南星無白點晒乾

蘿蔔子

炒另研

青皮

去點

紫蘇子

炒

橘紅

山查

杏仁

去皮尖炒研

葛根

神麴

炒

麥蘖

炒

香附

各二兩

右為末蒸餅丸桐子大每服七十九食後茶湯下

薛新甫曰有一人素厚味胸滿痰盛內多積熱服之而愈彼見有效修合便送脾胃虛者無不受害

欬嗽

日有聲無痰曰欬肺由火燥有痰無聲曰嗽脾受濕侵有痰有聲曰欬嗽

黃帝問曰肺之令人欬何也

此言欬而不言嗽者省文也如秋一篇兼有嗽字則知此岐伯對曰五臟六腑皆令人欬非獨肺

一篇兼有嗽字則知此岐伯對曰五臟六腑皆令人欬非獨肺

也皮毛者肺之合也而皮毛為外合也應皮毛先受邪氣邪氣

以從其合也其寒飲食入胃從肺脉上至於肺則肺寒於中焦

下絡大腸還循胃口上膈屬肺故肺寒則外內合邪因而客之
胃受寒則從肺脉上至於肺也肺經受寒內應外五臟各以其
則為肺欬外則皮毛受邪內則肺經受寒飲冷則傷肺是也五臟各以其
時受病非其時各傳以與之肺冬腎是也非其時而病者乃他
藏相傳也人與天地相參故五臟各以其時治時感於寒則受病微
則為欬甚則為泄為痛各以時治者四時所傷不同法因之而
痛寒在裏則腹痛惟其外乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之
內合邪故為病亦兼內外乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之
乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之
四藏各以其時受病曰先受之肺欬之狀欬而喘息有音甚則
者則次便及平肺而為欬矣肺欬之狀欬而喘息有音甚則
唾血肺屬金所主惟音聲肺自病故喘息有音唾血者欬之狀
欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺心脉起於心中出
故病喉間如梗噎中喉痺肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可
介介如有所梗妨礙之意肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可
以轉轉則兩脇下滿肝脉布脇肋故病如此脾欬之狀欬則右

肱下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇脾脉上膈挾咽

右肱下痛陰然痛引肩背者脾土體部故不可以動也脾欬則

之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下豈非陽上之氣腎欬

應於艮而出東北乎人與天地相參理有無往不台者

之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎腎系於腰背其脉貫脊故

脉直者入肺循喉五臟之久欬乃移於六腑府藏病日久乃移於

裏相脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長重出脾

移也胃必受之胃不能容氣逆而嘔長重出肝欬不已則胆受

重也居腸胃之中嘔甚則隨氣而上出矣

之胆欬之狀欬嘔胆汁胆汁苦肺欬不已則大腸受之大腸欬

狀欬而遺失遺失矢尿同心欬不已則小腸受之小腸欬狀

欬而失氣氣與欬俱失小腸之化故小腸受邪而欬則下奔失氣

腎欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺溺膀胱為津液之府

遺溺久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲久欬

中下三焦俱病出納升降皆失其和且此皆聚於胃關於肺使
三焦火衰不能生土故腹滿不能食飲此總結諸欬之證也諸欬皆聚於
人多涕唾而面浮腫氣逆也胃關於肺者胃為藏府之本根肺
為臟腑之華蓋如上文所云皮毛先受邪及寒飲食入胃者皆
浮腫肺主氣逆帝曰治之奈何岐伯曰治藏者治其俞治府者治
其合浮腫者治其經此治法也脉之所注者為俞所入者為合
示從容篇曰欬嗽煩冤者腎氣之逆也腎虛而能火亢上則乘
此虛癆之候也

按欬雖肺病五臟六腑皆能致之初其條目經文尚有漏義總
其綱領不過內傷外感而已風寒暑溼傷其外則先中於皮毛
皮毛為肺之合肺邪不解他經亦病此自肺而後傳於諸藏也
勞慾情志傷其內則藏氣受傷先由陰分而病及上焦此自諸
藏而後傳於肺也自表而入者病在陽宜辛溫以散邪則肺清

而欬愈自內而生者病在陰宜甘以壯水潤以養金則肺寧而
欬愈大抵治表者藥不宜靜靜則留連不解變生他病故忌寒
涼收斂如五藏生成篇所謂肺欲辛是也治內者藥不宜動動
則虛火不甯燥痒愈甚故忌辛香燥熱如宜明五氣篇所謂辛
走氣氣病無多食辛是也然治表者雖宜動以散邪若形病俱
虛者又當補中氣而佐以和解倘專於發散恐肺氣益弱腠理
益疎邪乘虛入病反增劇也治內者雖宜靜以養陰若命門火
衰不能歸元則參芪桂附在所必用否則氣不化水終無補於
陰也至夫因於火者宜清因於溼者宜利因痰者消之因氣者
理之隨其所見之證而調治在老人虛人皆以溫養脾肺為主
稍稍治標可也若欲速愈而亟攻其邪因而危困者多矣謹之
分條治欬法

肺欬

麻黃湯

心欬

桔梗湯

肝欬

小柴胡湯

脾欬

升麻湯

腎欬

麻黃附子胃欬烏梅胆欬黃芩加半大腸欬赤石脂禹餘糧湯

散小腸欬芍藥甘草膀胱欬茯苓甘草三焦欬錢氏異感風者惡風

自汗鼻流清涕脉浮桂枝湯加防風感寒者惡寒無汗鼻流清

涕脉緊二陳湯加紫蘇春月風寒所傷頭痛聲重金沸草散夏月喘

嗽面赤脉洪黃連解毒秋月身熱自汗口乾便赤脉虛大自虎冬

月風寒形氣病氣俱實感溼者身體重痛白朮熱嗽咽喉乾痛

鼻出熱氣痰濃腥臭金沸草散去麻黃半夏加薄荷枇杷乍寒

亦嗽乍熱亦嗽金沸草散二方煎服七情飢飽邪氣上逆四七湯加

子桑皮人參阿膠飲冷致嗽紫苑嗽吐痰食俱出二陳湯加水

麥門冬枇杷葉二陳湯加瓜蒌蘇聲啞外感寒包熱者細辛半

食積痰嗽子山查枳實連服聲啞夏生薑辛以散之內傷

火來剋金者為讓經年久嗽服藥不瘥餘無他證與勞嗽異一

證宜壯水清金八味丸暴嗽諸藥不效大兔絲子不可以其

百部咳嗽煩冤安腎丸暴嗽諸藥不效暴嗽而後遺補之非

欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯醋搶而嗽甘草二兩去皮作二

肺汁五枚浸三日火炙為末蜜食鹹哮喘白麵二錢砂糖二錢

燒內煨熟剉出加輕粉四錢另炒將餅切作四燒餅灰汁捻作餅子

肺脹欬而上氣鼻扇擗肩脉浮大者越婢加半湯主之無外邪而內虛

之肺脹宜詞子海石香附瓜蒌仁青黛肺脹躁喘脉浮心下有

水小青龍湯肺脹而左右不得眠此痰夾瘀血碍氣而病湯加

桃仁詞子青皮竹瀝韭汁

脉候脉出魚際為逆氣喘息欬而脉虛必苦胃浮直而

濡者易治喘而氣逆脉數有熱不得卧難治上氣喘嗽而

腫肩息脉浮大者死久嗽脉弱者生實大數者死上氣喘

嗽低昂脉滑手足溫者生脉濇四肢寒者死欬而脫形身熱

脉小堅急以疾為逆不過十五日死欬嗽羸瘦脉形堅大者

死 咳嗽脉沉緊者死 浮直者生浮軟者生小沉伏匿者死
欬而嘔腹滿泄瀉弦急欲絕者死

醫案

文學金伯倉欬而上氣凡清火潤肺化痰理氣之劑幾無遺用
而病不少衰余診其腎脉大而軟此氣虛火不歸元用人參三
錢煎湯送八味九五錢一服而減後於補中益氣湯加桂一錢
附子八分凡五十劑及八味丸二觔而瘥

太學史明麟經年欬更醫數十人藥不絕口而病反增劇自
謂必成虛癆余曰不然脉不數不虛惟右寸浮大而滑是風痰
未解必多服酸收故久而彌甚用麻黃杏仁半夏前胡桔梗甘
草橘紅蘇子五劑知十劑已

張遠公三年久嗽服藥無功委命待盡一日以他事造予居自

謂必不可治姑乞診之余曰飢時胸中痛否遠公曰大痛視其上唇白點如糟者十餘處此重嘔其肺用百部膏一味加烏梅槀榔與服不十日而痛若失咳賴止矣令其家人從淨桶中查之有寸白蟲四十餘條自此永不復發

麻黃湯 小柴胡湯 升麻湯 烏梅丸 黃芩加半夏生薑

湯 赤石脂禹餘糧湯 麻黃附子細辛湯 茯苓甘草湯

桂枝湯 黃連解毒湯 白虎湯 小青龍湯以上並二陳湯

見痰異功散 四物湯 補中益氣湯見虛

金沸草散 治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽

旋覆花去梗 麻黃去節 前胡去蘆各 荆芥穗錢一 甘草炒

半夏湯泡 赤芍藥各五錢

水一鍾半生薑三片棗一枚煎八分溫服

加減麻黃湯 治感寒欬

麻黃去節 二錢 杏仁 半夏薑製各一錢 桂枝 甘草炙

紫蘇葉各五分 橘紅 一錢 水二鍾薑四片煎一鍾服

射干麻黃湯

射干 細辛 紫苑 欬冬花各三兩 麻黃

生薑各四兩 五味子 半夏各半升 大棗 七枚

水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥煮取三升分三服

麻黃附子細辛湯 治腎藏發欬腰背引痛

麻黃 細辛各二錢 附子 一錢 水一鍾煎七分服

四七湯 治七情氣鬱上逆為欬

半夏湯泡五錢 茯苓去皮 五錢 紫蘇淨葉 八分 厚朴薑製 一錢

水二鍾生薑七片紅棗二枚煎一鍾服

大兔絲子丸 治腎虛上逆欬嗽

兔絲子 洗淨澤瀉

鹿茸 去毛炙

石龍芮 去火肉桂 去粗皮

附子 各一兩 泡去皮石薺 去根

熟地黃

白茯苓 去皮巴戟 去心

牛膝 酒浸一兩 肉蓯蓉 酒浸

山茱萸 去核

續斷 茴香 炒

防風 去蘆

杜仲 去粗皮 補骨脂 去毛

萆澄茄 沉香 各二兩

覆盆子 去枝葉 桑螵蛸 炒酒浸

五味子 芎藭 各半

右為末酒煮麵糊丸如桐子大每服三錢空心鹽湯下

安腎丸 治腎虛欬逆煩冤

肉桂 去粗皮烏頭 炮去皮

桃仁 麩炒 白蒺藜 炒去刺 巴戟 去心

山藥 茯苓 去皮

肉蓯蓉 酒浸 石薺 去根 萆薢

白朮 炒 補骨脂 各三兩

右為末蜜丸梧子大每服三錢空心鹽湯下

越婢加半夏湯 治肺脹喘嗽鼻扇肩擡

麻黃

六兩

石膏

半斤

大棗

十五枚

甘草

一兩

半夏

半升

生薑

三兩

水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分溫服

白朮酒

感溼欬嗽身體重痛

白朮

三兩泔浸一宿土蒸切片慢火炒黃用

酒二鍾煎八分服

觀音應夢飲

定喘止嗽

人參

一錢

胡桃

二枚去殼留衣

水一鍾薑五片棗二枚臨卧煎服

清音丸

桔梗

訶子

各一兩

甘草

五錢

礪砂

青黛

各三錢

冰片

三分

右蜜丸龍眼大每服一丸噙

保和湯

治久嗽成癆

知母

見水炒

貝母

去心

天門冬

去心

麥門冬

去

欵冬花各一錢 天花粉 薏苡仁炒 杏仁去皮尖

五味子十二粒 馬兜鈴 紫苑 桔梗 百合

阿膠炒 當歸 石部各六分 甘草炙 紫蘇

薄荷各四分 水二鍾姜三片煎七分入飴糖一匙食後服吐

血加炒蒲黃生地黃小薊 痰多加橘紅茯苓瓜蒌仁 喘

去紫蘇薄荷加蘇子桑皮陳皮

本事髓甲丸 治虛癆咳嗽耳鳴眼花此方服者必效毋忽

五味子二十兩 髓甲 地骨皮各三兩

右爲末蜜丸梧子大空心食前鹽湯下四錢婦人醋湯下

甯肺湯 治營衛俱虛發熱自汗喘嗽

人參 當歸 白朮 熟地黃 川芎

白芍藥 五味子 麥門冬去心 桑白皮 白茯苓去皮

甘草

炙各一錢

阿膠

蛤粉炒一錢半

水一鍾

生薑五片

煎一鍾

食後服

治嗽補虛方

胡桃肉

四兩去皮另研

杏仁

四兩去皮另研

乾山藥

四兩研細

牛骨

一副取髓

白蜜

右將牛骨髓

白蜜砂鍋內

熬沸以絹帛濾

去渣盛在滋瓶內

將山藥杏仁胡桃

三味入瓶攪和

以紙蜜封瓶口

重湯煮一

日一夜每日早晨

白湯化一匙服

紫金散

治久嗽日夜不得眠

天南星

去皮

白礬

甘草

各五錢

烏梅

淨肉二兩

右爲粗散用慢火

於銀石器內炒

令紫色放冷研

爲細末每

服二錢臨卧時

身體入被內用

藥汁七分溫湯

三分煖令稍

熱調前藥末服

之嚥下使仰卧

低枕想藥入於

肺中須臾得

睡其嗽立止

救急方

杏仁

三升去皮尖及雙仁者炒研如泥

白蜜一升

牛酥二升

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升淨磨銅鎔勿令脂垢先傾三升汁於鎔中刻木記其深淺又傾汁二升以煖火煎減至於所記處卽內蜜酥等煎還至木記處貯於不津磁器中每日三度煖酒服一大匙和粥服亦可一七噀色變白二七噀稀三七欬斷

薰方 風寒久嗽非此不除

天南星

欬冬花

鵝管石

佛耳草

雄黃

等分爲末拌艾以蠶一厚片置舌上次於艾上燒之須令烟入喉中爲妙

人參清肺湯

治肺胃虛寒欬嗽喘急

桑白皮

去粗皮

杏仁

去皮尖 麩炒

地骨皮

人參

去蘆

阿膠

麩炒

烏梅

去核

炙甘草

知母

鷲栗殼

去蒂蜜 蓋炙

各一錢水二鍾棗一枚煎一鍾臨卧服

通聲煎

治欬嗽氣促滿悶失音

杏仁

一升去皮尖及雙仁者炒另研如泥

五味子

木通

菖蒲

人參

桂心

欵冬花

細辛

竹茹

酥

已上各三兩

生薑汁

白蜜

各一升

棗肉

二升

水五升微火煎七沸去渣內酥蜜薑汁棗肉再煎令稠每服

一匙噙化

喘者喘者促促氣急喝痰聲張口撻肩搖身撮肚短氣

肺壅而呼吸不能下哮者與喘相類但無痰聲亦不撻肩但

多而有呀呷之音呷者口開呀者口閉開口閉口盡有音

聲呷呀二音合成呷字

以痰結喉間與氣相繫故呷呀作聲

三證極當詳辨

經曰諸病喘滿皆屬於熱火盛為夏熱火衰為冬寒故寒病則
寒為陰主乎遲緩熱為陽主乎急數故寒五藏生成篇曰欬嗽
則息遲氣微熱則息數氣龍而為喘也
上氣厥在胸中過在手陽明太陰肺上氣喘急也胸中者手太陰
之表二經之氣逆於
胸中則為喘嗽也
○秋脉不及則令人喘呼吸少氣及肺舍
虛也肺虛則短氣故云呼
○勞則喘息汗出疲勞過度則陽氣
吸少氣非有餘之喘也
於肺而喘外
○邪入六府則身熱不時卧上為喘呼則陽受之
達於表而汗
○邪入六府則身熱不時卧者
不能入府陽邪在表故身熱不時卧者
為息賁二陽者陽明也為胃與大腸也心脾為子母故胃府病
不能生金必傳於脾藏脾受傷必病母氣以自救則心亦病也土
則肺傷故息上賁而喘急
○肝脉若搏因血在脇下令人喘逆
肝為血海血瘀則脉搏
○腎者水藏主津液主卧與喘也
腎水不足虛火上越則不
○喘欬者是水氣并陽明也
土虛不
得靜而卧乃動而喘也
○夜行則喘出於腎淫氣病肺
此下四
氣道不利故為喘欬
府

屬氣病在陽也陰受氣於夜主靜夜行則勞有所墮恐喘出於
動腎主陰氣故喘出於腎陰傷陽勝故病肺有所驚恐喘出於
肝淫氣害脾脾於肝木淫乘上故害脾也有所驚恐喘出於肺淫
氣傷心驚恐則神氣散亂肺藏氣故喘度水跌仆喘出於腎與
骨水氣通於腎跌仆傷於骨故喘出焉

愚按內經論喘其因衆多究不越於火逆上而氣不降也挾虛
者亦有數條非子母情牽卽仇讐肆虐害乎肺金之氣使天道
不能下濟而光明者孰非火之咎耶雖然火則一而虛實則分
丹溪曰虛火可補參耆之屬實火可瀉芩連之屬每見世俗一
遇喘家純行破氣於太過者當矣於不及者可乎余嘗論證因
虛而死者十九因實而死者十一治實者攻之卽效無所難也
治虛者補之未必卽效須悠久成功其間轉摺進退良非易也
故辨證不可不急而辨喘證爲尤急也巢氏嚴氏止言實熱國

王海藏云肺氣果盛則清肅下行豈復為喘皆以火燥真氣氣

衰而喘所謂盛者非肺氣也肺中之火也斯言高出前古惜乎

但舉其端未能縷悉請得而詳之氣盛而火入於肺者補氣為

先六君子湯補中益氣湯陰虛而火來乘金者壯水為亟六味地黃丸風寒者

解其邪華蓋散溼氣者利其水滲瀝湯暑邪者滌其煩白虎湯香薷散肺

熱者清其上三冬二母甘桔梔苓痰壅者消之二陳湯氣鬱者疎之四七湯飲

停者吐之防已湯吐之不愈杜火質者清之白虎湯加瓜蒌仁肺癰而

喘保金化毒葭仁甘草節桔梗貝母肺脹而喘利水散邪肺脹

欬而上氣喘而煩躁目如脫狀肺浮大者越婢加腎虛火不歸

半夏湯肺浮者心下有水小青龍湯加石膏主之腎虛火不歸

經導龍人海八味丸腎虛水邪泛濫逐水下流金匱腎別有哮

證似喘而非呼吸有聲呀呷不已良由痰火鬱於內風寒束其

外或因坐卧寒溼或因酸醎過食或因積火薰蒸病根深久難

以卒除避風寒節厚味禁用涼劑恐風邪難解禁用熱劑恐痰

火易升理氣疎風勿忘根本爲善治也

宜蘇子枳殼桔梗防風半夏瓜蒌茯苓甘草如

冬月風甚加麻黃夏月痰多加石膏挾寒者多用生薑哮喘證發於冬初者多先於八九月

未寒之時用大承氣下其熱至冬寒時無熱可包此爲妙法如

上諸款皆其大綱若五臟六腑七情六氣何在非致喘之由須

知舉一隅卽以三隅反方不媿爲明通可以司人之命矣

脉候 喘逆上氣脉數有熱不得卧者死 上氣面浮腫肩息

脉浮大者危 上氣喘息低昂脉滑手足溫者生脉澁四肢寒

者死 右寸沉實而緊爲肺感寒邪亦有六部俱伏者宜發散

則熱退而喘定 喘脉宜浮遲不宜急疾

醫案

大學朱甯宇在監時喘急多痰可坐不可卧可俯不可仰惶急

求治余曰兩尺獨大而軟爲上盛下虛遂以地黃丸一兩用桔梗三錢枳殼二錢甘草一錢半夏一錢煎湯送下不數劑而安給練黃健菴中氣大虛發熱自汗喘急余診之脉大而數按之如無此內有真寒外見假熱當以理中湯冷飲舉家無主不能信從惟用清火化痰之劑遂致不起

葉震瀛夫人喘急痞悶肌膚如灼汗出如洗目不得瞑余診之六脉皆大正所謂汗出如油喘而不休絕證見矣越三日歿社友宋敬夫令愛中氣素虛食少神倦至春初忽喘急悶絕手足俱冷咸謂立斃矣余曰氣虛極而金不清肅不能下行非大劑溫補決無生理遂以人參一兩乾薑三錢熟附子三錢白朮五錢一服卽甦後服人參七觔餘薑附各二觔全愈不復發社友孫芳其令愛久嗽而喘凡順氣化痰清金降火之劑幾於

遍嘗絕不取效一日喘甚煩躁余視其目則脹出鼻則鼓肩脉則浮而且大肺脹無疑矣遂以越婢加半夏湯投之一劑而減再劑而愈余曰今雖愈未可恃也當以參朮補元助養金氣使清補不行竟因循月許終不調補再發而不可救藥矣

文學顧明華十年哮喘百藥無功診其兩寸數而濇余曰濇者痰火風寒久久盤踞根深蒂固矣須補養月餘行吐下之法半年之間凡吐下十次服補劑百餘遂愈更以補中益氣爲丸加雞子秋石服年許永不復發

補中益氣湯

見類中風

六君子湯

六味丸

八味丸

見虛癆

金匱腎

氣丸

見水脹

白虎湯

香薷湯

見暑

二陳湯

三拗湯

見痰

治寒燥不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃節

不去

杏仁

不去

甘草

不分各

每服五錢水一鍾薑五片煎服取汁

華蓋散 治肺風痰喘

麻黃去根節 紫蘇子炒

杏仁炒去皮尖 桑白皮炒 赤茯苓去皮

橘紅各一錢 甘草五分 水一鍾薑五片紅棗一枚煎一鍾服

滲溼湯 治溼傷身重而喘

蒼朮 白朮 甘草炙各一兩 茯苓去皮 乾薑炮各二兩

橘紅 丁香各二錢五分

每服四錢水一盞棗一枚薑三片煎七分服

越婢加半夏湯

麻黃六兩 石膏半觔 生薑三兩 甘草一兩 半夏半升

大棗十五枚

水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

小青龍加石膏湯

麻黃

芍藥

桂枝

細辛

甘草

乾薑

各三錢

五味子

半夏

各半兩

石膏

二兩

水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升強人服一升羸者減之曰三服

四七湯

見欬嗽

加減瀉白散

桑白皮

一兩

地骨皮

知母

陳皮

去白

桔梗

各五錢

青皮

去白

黃芩

炙甘草

各三錢

每服五錢水二鍾煎一鍾食後服

木防已湯

木防已

三兩

石膏

鷄子大塊

桂枝

二兩

人參

四兩

水六升煮取二升分溫再服

千縉湯 治喘急有風痰

半夏七枚 製熟 皂角去皮 甘草炙各一寸 水一碗煮減半頓服

半夏丸 傷風痰喘兀兀欲吐惡心欲倒

半夏一兩 枳櫚 雄黃各三錢

右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸桐子大每服五十九薑湯下

定喘奇方 治稠痰壅盛體肥而喘

橘紅二兩 明男五錢 同炒香去礬用 半夏一兩 五錢 杏仁麩炒一兩

瓜蒌仁去油一兩 炙甘草七錢 黃芩酒炒五錢 皂角去皮弦子燒存性三錢

右爲末淡薑湯打蒸餅糊爲丸菴豆大每食後白湯下一錢

日二次五日後下痰而愈虛人每服七分

簡易黃九子 消痰定喘及胸膈

雄黃研細水飛 雌黃研細各三錢 山梔仁七枚 菴豆四十粒

明礞

二分細研並生用

右爲末稀糊丸菜豆大每服一二九薄荷細茶湯臨卧服

清金丹

治食積痰哮喘遇厚味卽發

蘿蔔子

淘淨蒸熟晒乾爲末一兩

猪牙皂角

燒存性三錢

右以生薑汁浸蒸餅丸菜豆大每服三五十丸嚥下

水哮方

芫花

爲末

大水上浮

浮過大米粉

右三味搜爲糲清水煮熟恣意食之

壓掌散

治男婦哮喘

麻黃

去節二錢五分

炙甘草

二錢

白果

五枚打碎

水煎臨卧服

醫宗必讀卷之九

終

施委山莊重校醫宗必讀卷之十

雲間李中梓士材父著

新安吳肇陵君如父參

姪孫李廷芳蘅伯父訂

痺 行痺 痛痺 着痺

內經曰風寒溼三氣雜至合而為痺也痺者閉也風寒溼三氣

不行則其風氣勝者為行痺風者善行而數變故為行痺行而

為痺也其寒氣勝者為痛痺寒氣凝結陽氣不行故痛

是也火氣勝者為着痺火氣勝者為着痺

是也寒氣勝者為痛痺寒氣凝結陽氣不行故痛

是也火氣勝者為着痺火氣勝者為着痺

是也寒氣勝者為痛痺寒氣凝結陽氣不行故痛

是也火氣勝者為着痺火氣勝者為着痺

是也寒氣勝者為痛痺寒氣凝結陽氣不行故痛

不已復感於邪內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺各以

其時重感於風寒溼也舍者邪入而居之也時者氣主之時五

氣必更深故內舍肺痺者煩滿喘而嘔肺在上焦其脈循胃口

心痺者脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘監乾善噫厥氣上則

恐心合脈而痺氣居之故脈不通心脈起於心中其支者上挾

之故神肝痺者夜卧則驚多飲數小便上為引如懷肝藏魂肝

不安故夜卧則驚肝脈下者過陰器抵少腹腎痺者善脹尻以

上者循喉嚨之後上入項賴故為病如此邪乘胃故善脹尻以

代踵脊以代頭代踵者胃之關腎氣痺則陰邪乘胃故善脹尻以

腎脈入跟中上膈內出臑脾痺者四支解情發欬嘔汁上為大

寒脾主四支故為懈惰其脈屬脾絡胃上膈挾咽氣痺腸痺者

數飲而出不得中氣喘爭時發殄泄腸者兼大小腸而言腸間

雖數飲而小便不得出小便不出則木未俱病胞痺者少腹膀胱

故與中氣喘爭蓋其清濁不分故時發殄泄

膀胱之內痛若沃以湯澀於小便上爲清涕膀胱者膀胱之腑也膀胱氣閉故按之
內痛水閉則畜而爲熱故若沃以湯澀於小便使也膀胱之脈從顙入絡腦故上爲清涕

愚按內經論痺四時之令皆能爲邪五藏之氣各能受病六氣之中風寒溼居其半卽其曰雜至曰合則知非偏受一氣可以致痺又曰風勝爲行痺寒勝爲痛痺溼勝爲着痺卽其下一勝字則知但分邪有輕重未嘗非三氣雜合爲病也皮肉筋骨脉各有五藏之合初病在外久而不去則各因其合而內舍於藏在外者祛之猶易入藏者攻之實難治外者散邪爲亟治藏者養正爲先治行痺者散風爲主禦寒利溼仍不可廢大抵參以補血之劑蓋治風先治血血行風自滅也治痛痺者散寒爲主疎風燥溼仍不可缺大抵參以補火之劑非大辛大溫不能釋其凝寒之害也治着痺者利溼爲主祛風解寒亦不可缺大抵

參以補脾補氣之劑蓋土強可以勝溼而氣足自無頑麻也提其大綱約畧如此分條治法別列於左

筋痺卽風痺也游行不定上下左右隨其虛邪與血氣相搏聚

于關節或赤或腫筋脉弛縱古稱走注今名流火防風湯主之如意通聖散

桂心散沒藥散虎骨丸十生脉痺卽熱痺也臟腑移熱復遇外

邪客搏經絡留而不行故痺痺肌肉熱極唇口反裂皮膚色變

升麻湯 肌痺卽着痺濕痺也留而不移汗多四肢緩弱皮膚不

仁精神昏塞今名麻木神效黃耆湯主之皮痺者邪在皮毛癰癢風瘡

搔之不痛宜疎風骨痺卽寒痺痛痺也痛苦切心四肢攣急關

節浮腫五積散腸痺者五苓散加桑皮胞痺者腎着湯五藏痺

五痺湯肝痺加棗仁柴胡心痺加遠志茯神麥門冬犀角脾痺

加厚朴枳實砂仁神龜肺痺加半夏紫菀杏仁麻黃腎痺加獨

活官桂杜仲牛膝黃耆萆薢

脉候 大而濇爲痺 脉急亦爲痺 肺脉微爲肺痺 心脉微爲心痺 右寸沉而遲濇爲皮痺 左寸結不流利爲血痺 右關脉舉按皆無力而濇爲肉痺 左關弦緊而數浮沉有力爲筋痺

醫案

文學陸文湖兩足麻木服活血之劑不效改服攻痰之劑又不效經年載後兩手亦麻木左脇下有尺許不知痛痒余曰此經所謂着痺也六脉大而無力氣血皆損用神效黃耆湯加茯苓白朮當歸地黃十劑後小有效更用十全大補五十餘劑始安孝廉王春卿久患流火靡藥弗嘗病勢日迫商之余曰尙可療否余曰經年之病且痛傷元氣非大補氣血不可春卿曰數月前會服參少許痛勢大作故不敢用余曰病有新久之不同今

大虛矣而日從事於散風清火清火則脾必敗散風則肺必傷
言之甚力竟不能決遂致不起

鹽薑葉作舟遍體疼痛尻髀皆腫足膝攣急余曰此寒傷榮血
筋脉爲之引急內經所謂痛痺也用烏藥順氣散七劑而減更
加白朮桂枝一月而愈

防風湯

杏仁去皮尖

當歸酒洗

赤茯苓去皮防風錢各一

黃芩

秦艽

葛根各二錢

羌活八分桂枝

甘草各五分

水二鍾薑三片煎七分入好酒半鍾食遠服

如意通聖散 治走注疼痛

當歸去蘆

陳皮去白

麻黃去節甘草炙

川芎

御米殼去頂

丁香各等分

右用慢火炒令黃色每服五錢水二鍾煎一鍾服如腰腳痛加虎骨乳香沒藥心痛加乳香良薑此治痺痛之仙藥也

桂心散

桂心

漏蘆

威靈仙

芎藭

白芷

當歸

去蘆

木香

白殭

炒

地龍

炒去土各半兩

右爲細末每服二錢溫酒下

沒藥散

治遍身百節走注疼痛

沒藥

二兩另研

虎骨

四兩醋炙

右爲細末每服五錢酒下日再服

小烏犀丸

烏犀角

乾蝎

炒

白殭

炒

地龍

去土硃砂水飛

天麻

煨

羌活

去蘆

芎藭

防風

去蘆

甘菊花

去蒂

蔓荊子

各一兩

牛黃

另研

麝香

另研

乾薑

炮各五錢虎脰骨醋炙

當歸 去蘆

敗龜

白花蛇 酒浸

天南星 薑製肉桂皮去麝

附子 炮去皮臍

海桐皮

木香 忌火

人參 去蘆各七錢

爲細末研勻煉蜜丸彈子大每服一九溫酒或薄荷湯送下

虎骨丸

虎骨 四兩醋炙

五靈脂 醋淘去沙 白殭蠶 炒

地龍 去土炒 白膠香 另研

威靈仙 各一兩 川烏頭 三兩炮

胡桃肉 二兩半去衣研

爲末酒糊丸梧子大每服十九空心酒下日二服

十生丹

天麻 防風 去蘆

羌活 去蘆 獨活 去蘆 川烏

草烏 去蘆

何首烏

當歸 去蘆

海桐皮 川芎 各等分俱生用

右蜜丸每丸重一錢每服一九茶湯磨服

一粒金丹

草烏頭

剉炒

五靈脂

各一兩

地龍

炒末土

木鼈子

各半兩

白膠香

一兩

當歸

去蘆各一兩

麝香

一錢

為末糯米糊丸桐子大每服三丸溫酒下服藥後微汗為效

乳香應痛丸

草烏頭

半兩

五靈脂

赤石脂

各一兩

乳香

半兩

沒藥

五錢

右為末醋糊丸雞豆大每服十五丸空心溫酒送下日二服

升麻湯

升麻

三錢

茯神

去皮

人參

防風

犀角

鎊

羚羊角

鎊

羌活

各一錢

官桂

三分

水二鍾煎八分入竹瀝半酒鍾服

神效黃芪湯

黃耆

二錢

人參

去蘆

白芍藥

炙甘草

各一錢

蔓荊子 二分 陳皮 五分去白

水二鍾煎一鍾去渣臨卧服小便澀加澤瀉有熱加酒炒黃

黃耆一錢眼縮小去芍藥忌酒醋濕麵葱蒜韭生冷

人參益氣湯 治夏月麻木倦怠嗜卧

黃耆 八錢 人參 生甘草 各五錢 炙甘草 二錢 芍藥 三錢

升麻 二錢 柴胡 二錢 五味子 十粒

每服半雨水二鍾煎一鍾空心服服後眠穩於麻痺處按

第二次藥煎服如前

黃耆 八錢 紅花 五分 陳皮 一錢 澤瀉 五分

第三次服藥

黃耆 六錢 黃蘗 二錢 陳皮 三錢 澤瀉 升麻 各三錢

白芍藥 五錢 甘草 生四錢 五味子 一百粒 生黃芩 八錢 炙甘草 一分

分四服煎服如前法秋去五味子冬去生黃芩 此方大效

五積散

治感冒寒邪頭疼身痛寒痺大痛無問內傷生冷外感寒邪皆效

蒼朮

洗淨去皮二十四兩

厚朴

去粗皮薑製

乾薑

各四兩炮

枳殼

去穰炒

麻黃

去根節

陳皮

去白各六兩

桔梗

去蘆十兩

半夏

湯洗七次

白芷

茯苓

當歸

川芎

甘草

炙

肉桂

芍藥

各三兩

每服四錢水一鍾薑三片葱白三根煎七分熱服挾氣加吳

茱萸調經催生用艾醋

五苓散

見泄瀉

腎著湯

見腰痛

腎瀝湯

麥門冬

去心

五加皮

犀角

各一錢半

赤芍藥

煨

桔梗

杜仲

薑汁炒去絲

木通

各一錢

桑螵蛸

一個

水一鍾入羊腎少許煎八分食前服

五痺湯 治五臟痺

人參

茯苓

當歸 酒洗

白芍藥 煨

川芎

各一錢 肝心腎三痺當倍用之

五味子

十五粒

白朮

一錢 脾痺倍之

細辛

七分

甘草

五分

水二鍾 薑一片 煎八分 食遠服

痿

手足痿軟而無力 百節緩縱而不收 證名曰痿

經曰肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生痿癰也肺痿者皮毛肺金在內則為葉焦在外則為皮毛虛弱急薄若熱氣留着心不去久而及於筋脉骨肉則病生痿癰者足弱不能行也氣熱則下脉厥而上上則下脉虛虛則生脉痿樞折挈脛縱而不任地也心痿者脉痿也心熱則火炎故三陰在下之脉亦皆如樞紐之折而不能提挈逆則下虛乃生脉痿者四肢關節之處足脛縱緩而不能任地也肝氣熱則胆泄口苦筋膜乾則筋急而攣發為筋痿肝痿者筋痿也胆附於肝肝熱則胆泄故口脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿脾痿者肉痿也脾與胃膜相連而開竅於口

故脾熱則胃乾而渴脾主肌肉熱畜於內則情氣耗傷故肌肉不仁發為肉痿枯而髓減發為骨痿腎痿者骨痿也腎者藏之長也為心之蓋也此言五藏之痿皆因肺熱最高有所失亡所求不得則發肺鳴則肺熱葉焦而傷肺氣鬱生火故呼吸有聲發為肺鳴金藏病則五藏因肺熱葉焦發為痿躄失其清肅之化故熱而葉焦肺氣熱則五藏之陰皆不足此痿躄所以生於肺也痿躄論痿者獨取陽明何也陽明者五臟六腑之海主潤宗筋總名論痿者獨取陽明何也陽明者五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也陽明者胃也主納水穀化精微以資宗筋宗筋者前陰所聚之筋也為諸筋之會凡腰脊谿谷之筋皆屬於此故主束骨而利機關也衝脉經脉之海也主滲灌谿谷陽明合於宗筋滲灌谿谷為十二經之海故主滲陰之經夾臍上行陽明脉亦夾臍旁陰陽總宗筋之會會於氣去中行二寸下行故皆會於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明為之長皆屬於帶脉而絡於督脉宗筋聚於前陰前

明少陽及衝任督三經之所會也九者之中陽明爲臟腑之
海衝爲經脈之海此一陰一陽總平其間故曰陰陽總宗筋之
會也會於氣街者氣街爲陽明之正脈改陽明獨爲之長帶脈
者起於季脇圍身一周督脈者起於會陰分三歧爲任衝而上
行腹背故諸經者皆歸於督脈也故陽明虛則宗筋縱帶脈不引故足
於帶脈支給於督脈也痿不川也則陽明虛則血氣少不能潤養宗筋故弛縱宗筋縱
痿不川也則帶脈不能收引故足痿不用所以常治陽明也
愚按痿者重疾也故內經疊出諸篇而前哲之集方論者或附
見於虛癆或附見於風溼大失經旨賴丹溪特表而出之惜乎
言之未備也經言病本雖五臟各有而獨重太陰肺經經言治
法雖諸經各調而獨重陽明胃經此其說何居乎肺金體燥居
上而主氣化以行令於一身畏火者也五臟之熱火薰蒸則金
被剋而肺熱葉焦故致疾有五臟之殊而手太陰之地未有不
傷者也胃土體溼居中而受水穀以灌溉於四肢畏木者也肺
經之受邪失正則木無制而侮其所勝故治法有五臟之分而

足陽明之地未有或遺者也夫既曰肺傷則治之亦宜在肺矣而岐伯獨取陽明又何也蓋樞所謂真氣所受於天與穀氣并而充身陽明虛則五臟無所稟不能行血氣濡筋骨利關節故百體中隨其不得受水穀處不用而為痿不獨取陽明而何取哉丹溪所以云瀉南方則肺金清而東方不實何胃傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有斯言當矣若胃虛減食者當以芳香辛溫之劑治之若拘於瀉南之說則胃愈傷矣霍香養誠能本此施治其於痿也思過半矣至於七情六淫挾有多端臨病製方非筆舌所能罄耳

治法 心氣熱則脉痿

鐵粉銀箔黃連苦參龍胆草石蜜牛黃

脾氣熱則肉痿

生地黄天門冬百合紫葳白茯苓杜仲草

肝氣熱則筋痿

黃芩白芍皮牡丹皮骨皮雷丸

肺氣熱則肉痿

天膏之屬 腎氣熱則骨痿 金剛丸牛膝丸加

肺熱痿

黃耆天麥門冬石斛百合山藥犀角挾濕熱健步九加

黃芩或

通草桔梗枯芩山梔杏仁秦芫之屬黃蘗蒼朮

清燥湯

二陳二妙血虛散補陰九二妙氣虛合二妙散氣血

俱虛

十全大食積木香積死血穿山甲紅花達朮實而有積湯承

氣湯

下數愈腎肝下虛陰九補益九虎潛九滋

醫案

太學朱修之八年痿廢更醫累百毫末無功一日讀余頤生微論千里相招余診之六脉有力飲食若常此實熱內蒸心陽獨亢證名脉痿用承氣湯下六七行左足便能伸縮再用大承氣又下十餘行手中可以持物更用黃連黃芩各一觔酒蒸大黃八兩蜜丸日服四錢以人參湯送一月之內去積滯不可勝數四肢皆能展舒余曰今積滯盡矣煎三才膏十觔與之服畢而面應酬如故修之家世金陵嗣後遂如骨肉歲時通問不懈

崇明文學倪君僑四年不能起床延余航海治之簡其平日所服寒涼者十六補腎肝者十三診其脉大而無力此營衛交虛以十全大補加秦艽熟附各一錢朝服之夕用八味丸加牛膝杜仲遠志菖蒲虎骨龜板黃柏溫酒送七錢凡三月而機關利藿香養胃湯 治胃虛不食筋無所養而成痿

藿香

白朮

炒透

人參

茯苓

苡仁

半夏麴

烏藥

神麴

炒

縮砂

炒各一錢半

菴澄茄

甘草

炒各一錢

水二鍾

薄五片

棗二枚

煎一鍾

服

二陳湯

見霞天膏

即倒倉法

清燥湯

見類中風

金剛丸

治腎虛精

敗骨痿

菖蒲

杜仲

炒去絲

肉蓯蓉

酒浸

兔絲子

酒浸各等分

右爲末酒煮猪腰子和丸梧子大每服五錢空心溫酒送下

牛膝丸

治腎肝虛骨痿筋弱

醫宗必讀

卷十

痿

九

牛膝酒浸

萆薢

杜仲絲炒去

白蒺藜

防風

兔絲子酒浸

肉蓯蓉酒浸等分

官桂減半

製服同金剛丸

加味四助丸

治腎肝虛筋骨痠

肉蓯蓉酒浸

牛膝酒浸

天麻

木瓜

鹿茸去毛切

熟地黃

五味子

酒浸兔絲子

酒浸另研各等分

右爲末蜜丸梧子大每服五錢空心酒下

煨腎丸

治肝脾腎傷宜緩中消穀益精

補骨脂

酒炒

萆薢

杜仲絲炒去

白蒺藜

防風

兔絲子

酒浸

肉蓯蓉

酒浸

葫蘆巴

牛膝等分

肉桂減半

右爲末將猪腰子製同食法和蜜杵丸梧子大每服五錢空

心酒送治腰痛甚效

健步丸

羌活

柴胡

錢各五

防風

三錢

川烏

一錢

滑石

錢炒五

澤瀉

三錢

防已

酒洗一兩

苦參

酒洗一錢

肉桂

甘草

炙

瓜蒌根

酒製各五錢

右為末酒糊丸梧子大每服二錢煎愈風湯空心送下見中風

虎潛丸

龜板

黃檗

各四兩

知母

熟地黃

各一錢

牛膝

三兩半

芍藥

一兩半

瑣陽

虎骨

酥炙

當歸各一兩

陳皮

七錢半

乾薑

半兩

為末酒糊丸加附子更妙

補陰丸

黃檗

知母

俱洗酒拌炒

熟地黃

敗龜板

酥炙

白芍藥

煨

陳皮

牛膝

酒浸各二兩

虎脰骨

酥炙

瑣陽

酒浸酥炙

當歸

酒洗各一兩半

冬加乾薑

錢五

右為末酒煮羯羊肉為丸鹽湯下

四物湯

四君子湯

十全大補湯

俱見虛勞

三化湯

見中風

大

小承氣湯

見傷寒

補益腎肝丸

柴胡

羌活

生地黃

苦參

防已

炒各五分

附子

炮

肉桂

各一錢

當歸

二錢

右細末熟水丸如芡實大每服四錢溫水送下

神龜滋陰丸

治足廢名曰痿厥

龜板

酒炙四兩

黃蘗

炒

知母

炒各二兩

枸杞子

五味子

鎖陽

各一兩

乾薑

半兩

為末猪脊髓為丸梧子大每服五錢

補益丸

白朮二兩

生地酒浸兩半

龜版酒浸

鎖陽酒浸歸身酒浸

陳皮

杜牛膝各一兩

乾薑七錢

黃檗炒虎脰骨酒浸

茯苓各半

五味子二錢

甘草炙一錢

白芍藥酒浸

兔絲子

酒蒸研如糊入餘藥末晒乾各一兩

右末紫河車為丸每服五錢

驚

經曰東方青色入通於肝其病發驚駭肝應東方於卦為震於

病為驚駭又曰足陽明之脉病惡人與火聞木音則惕然而驚者土

惡木也陽明多氣多血血氣壅則易熱熱則惡火

愚按外有危險觸之而驚心胆強者不能為害心胆怯者觸而

易驚氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣或自汗並溫胆湯

參代竹茹眠多異夢隨即驚覺溫胆湯加棗仁連子以金銀煎下或

定志丸卧多驚魘口中有聲與珠母丸外物卒驚宜行鎮重僧細

末茶調一錢或黃連安神丸

或熱鬱生痰

寒水散

或氣鬱生痰

加味四

丹溪曰

驚則神出於舍舍空得液痰涎永繫於胞絡之間

辰砂遠志

脉候寸口脉動為驚

驚者其脉止而復來其人目睛不轉

不能呼氣

溫膽湯

治心胆虛怯解事易驚或夢寐不祥心驚胆懾氣鬱生涎或短氣或自汗

半夏湯洗

枳實

竹茹各一兩

橘皮

兩半炙草四錢

白茯苓七錢

每服五錢水一碗薑七片棗一枚煎服

鎮心丸

治心血不足怔忡多夢如墮崖谷

酸棗仁

炒二錢半

車前子

去土

白茯苓

去皮

麥門冬

去心

五味子

茯神

去木

肉桂

各一兩

熟地黃

酒浸

龍齒

天門冬

去心

遠志

甘草水

山藥

各一兩

人參

硃砂

水飛為衣

右為末蜜丸梧子大每服三錢空心米湯下

遠志九

遠志去心 薑汁淹

石菖蒲各五錢

茯神

茯苓

人參

龍齒各一兩

爲末蜜九梧子大辰砂爲衣熟水送三錢

妙香散見痰

琥珀養心丹

治心跳善驚

琥珀另研二錢

龍齒煅另研一兩

遠志甘草湯煮去木

石菖蒲

茯神

人參

酸棗仁炒各五錢

生地黃

當歸各七錢

黃連三錢

柏子仁五錢

硃砂另研三錢

牛黃另研一錢

右爲末猪心血丸黍米大金箔爲衣燈心湯送五錢

定志九

菖蒲炒

遠志

去心各二兩

茯神

人參

各三錢

爲末蜜九梧子大硃砂爲衣米飲下三錢

珍珠母丸 治肝虛受風卧若驚狀

珠母

研細七分

當歸

熟地黃

各一兩半

人參

酸棗仁

柏子仁

犀角

茯苓

各一兩

沉香

龍齒

各五分

右爲末煉蜜丸桐子大辰砂爲衣每服三錢金銀薄荷湯下

黃連安神丸

治心亂煩熱胸中氣亂元元欲吐膈上伏熱

硃砂

一錢

黃連

酒炒一錢半

甘草

炙五分

生地黃

二錢

當歸頭

一錢

右爲細末蒸餅丸黃米大每服十九津下

獨活湯

獨活

羌活

人參

前胡

細辛

半夏

沙參

甘草

五味子

白茯苓

酸棗仁

炒各一兩

右爲末每服四錢水一鍾薑三片烏梅半個煎七分服

寒水石散

寒水石煨

滑石水飛各一兩

生甘草二錢半

為末每服二錢薑棗湯下

加味四七湯

半夏

舊製二錢五分厚朴舊製

茯苓

去皮各一錢半

蘇葉

茯神

各一錢

遠志

去心

菖蒲

甘草

各五分

水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾服

控涎丹

甘遂

去心

紫大戟

去皮

白芥子

各等分

石為末煮糊丸桐子大臨臥淡薑湯下七丸

悸

心悚也築築然跳動也

經曰心痺者脉不通煩則心下鼓

閉而不通病熱鬱而為涎涎成則煩心下鼓動鼓者跳動

如擊鼓也五痺湯加扶神遠志半夏

愚按經文及原病式云水衰火旺心胸躁動天王補心丹主之傷寒論

曰心為火而惡水水停心下築築然跳動不能自安半夏麻黃丸茯苓飲

子亦有汗吐下後正氣虛而悸不得卧者溫胆丹溪責之虛與

痰辰砂遠志丸有證狀不齊總不外於心傷而火動火鬱而生

涎也若夫虛實之分氣血之辨痰與飲寒與熱外傷天邪內傷

情志是在臨證者詳之

五痺湯見痺控涎丹溫胆湯俱見

天王補心丹 壯水補心清熱化痰定驚悸

人參五錢 當歸酒浸 麥門冬去心 五味子 天門冬去

栢子仁 酸棗仁各一 白茯苓 玄參 丹參

桔梗 遠志各五錢 生地黃四兩 黃連酒洗炒二兩

爲末蜜丸桐子大硃砂爲衣每服三錢燈心竹葉煎湯送下
半夏麻黃丸

半夏

麻黃各等分

爲末蜜丸桐子大每服一錢日三服

茯苓飲子

治痰飲伏於心胃悸動不已

赤茯苓

去皮

熟半夏

白茯苓去木麥門冬

去心

橘紅各二錢

檳榔

沉香忌火

甘草炙一錢二分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

辰砂遠志丸

安心神化風痰

石菖蒲

去毛

遠志去心

人參

茯神

去木

辰砂各半兩

川芎

山藥

鐵粉

麥門冬

去心細辛

天麻

半夏麴

南星

炒黃

白附子

生各一兩

爲末生薑五兩取汁入水煮糊丸如菉豆大別以硃砂爲末

每服一錢臨臥薑湯服

恐

經曰在臍為腎在志為恐又云精氣併於腎則恐恐者腎之情志下章之言

他藏者亦莫肝藏血血不足則恐肝者腎之子也水強則胆不銖於腎也

胃為恐胃屬土腎屬水土○心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼

自失心藏神神傷則心怯所以恐懼自失火傷畏水之故

按經文論恐有腎肝心胃四藏之分而肝胆於腎乙癸同源者也胃之於腎侮所不勝者也心之於腎胃其所勝者也故恐之

一證屬腎之本志而旁及於他藏治法則有別焉治腎傷者宜

味厚枸杞遠志地黃山茱萸治肝膽者宜養陰棗仁山茱萸杜

草龍齒茯苓牛膝杜仲之屬治陽明者壯其氣四君子湯治心君者鎮其神琥珀金匱

之屬治少陰者齒之屬治厥陰者

人參散 治肝腎虛而多恐不能獨卧

人參

枳殼

五味子

桂心

甘菊花

茯神

山茱萸

枸杞子

各七錢半

栝子仁

雨一

熟地黃

雨一

右爲細末每服二錢溫酒調下

茯神散

治胆胃不足心神恐怯

茯神

一兩

遠志

防風

細辛

白朮

前胡

熟地黃

甘菊花

人參

桂心

各七錢半

枳殼

半兩

爲粗末每服三錢水一鍾薑三片煎至六分

溫服

補胆防風湯

治胆虛目暗眩冒夢見闕訟恐懼而色變

防風

一錢

人參

七分

細辛

芎藭

甘草

茯神

獨活

前胡

各八分

爲末每服四錢水鍾半棗二枚煎八分服

一儒者久困塲屋吐衄盈盆疰羸骨立夢鬪爭恐憊遇勞卽發
補心安神投之漠如一日讀素問乃知魂藏於肝肝藏血作文
苦衄血多則魂失養故交曉卽魘非峻補不可而草木力薄以
酒溶鹿角膠空腹飲之五日而安卧一月而神甯鹿角峻補精
血血旺神自安也

健忘

經曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心氣虛虛則營衛留於下
久之不以時上故善忘也上氣者心家之清氣下氣者脾胃之
濁氣營衛留於下則腎中之精氣不
能時時上交○腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言怒
於心故健忘
肝之志而非傷腎者肝腎爲子母氣相通血併於下氣併於上
也腎藏志志傷則意失而善忘其前言也
亂而喜忘血併於下則無以養其心氣併於上則無以充
其腎水下火上坎離不交亂其揆度故喜忘也
愚按內經之原健忘俱責之心腎不交心不下交於腎濁火亂

其神明腎不上交於心精氣伏而不用火居上則因而為痰水居下則因而生躁擾擾紆紆昏而不甯故補腎而使之時上養心而使之善下則神氣清明志意常治而何健忘之有

治法思慮過度

歸脾湯

精神衰倦

人參養榮湯

痰迷心竅

導痰湯送下

心腎不交

朱雀丸

歸脾湯 治思慮傷心脾健忘怔忡

人參

茯神

龍眼肉

黃耆

酸棗仁

炒

白朮

各二錢半

當歸

遠志

各一錢

木香

甘草

各三分

水二鍾薑五片紅棗一枚煎一鍾服

人參養榮湯

見虛癆

導痰湯

見痰飲

甯志膏

人參

酸棗仁

各一兩

辰砂

五錢

乳香

二錢

爲末蜜丸彈子大每服一九薄荷湯送下

壽星丸

南星

一觔搗坑深二尺炭五觔坑內燒紅掃淨酒澆南星下坑急蓋密一宿焙

琥珀

四兩另研

硃砂

一兩水飛一半爲衣

猪心血三個生薑汁打麴糊丸如梧子大每服三錢人參湯

空心送下日三服

朱雀丸

沉香

一兩

茯神

四兩

爲末蜜丸小豆大每服三十丸人參湯下

不得卧

經曰衛氣不得入於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿則

陽蹻盛不得入於陰則陰氣虛故目不瞑矣

行陽則寤行陰則寐此其常也失其

常則不得靜而藏魂目不得瞑胃者六腑之海其氣下行陽明逆不得從其道故不卧下經曰胃不和則卧不安此之謂也寤從陽而主上寐從陰而主下胃氣上逆則壅於肺而息有音不得從其陰降之道故卧不安也又曰卧則喘者水氣之客也夫水者循津液而流腎者水藏主津液主卧與喘也卧則喘者亦病者其本在腎其末在肺故為不得卧卧則喘者標本俱病也

愚按內經及前哲諸論詳考之而知不寐之故大約有五一曰

氣虛六君子湯加酸棗仁黃芪一曰陰虛血少心煩酸棗仁一兩生地一曰

痰滯溫胆湯加南星一曰水停輕者六君子湯加蒼朮一曰胃

不和橘紅甘草石薺茯苓半夏神麴山查之類大端雖五虛實寒熱互有不齊神而

明之存乎其人耳

六君子湯見虛溫胆湯控涎丹俱見

酸棗湯治虛癆虛煩不得眠

酸棗仁 一兩 甘草 一錢

知母

茯苓

芎藭 各二錢

水二鍾煎八分服

鼈甲丸 治四肢無力胆虛不眠

鼈甲

酸棗仁

羌活

牛膝

黃耆

人參

五味子 各等分

為末蜜丸梧子大每服三錢酒下

羌活勝溼湯

治卧而多驚邪在少陽厥陰

羌活

獨活

藁本

防風 各一錢

蔓荊子 三錢

川芎 二分

甘草 炙五分

水二鍾煎一錢食後服

不能食

東垣云胃中元氣盛則能食而不傷過時而不飢脾胃俱旺能食而肥脾胃俱虛不能食而瘦繇是言之則不能食皆作虛論若傷食惡食心下痞滿自有治法不在此例 羅謙甫云脾胃弱而食少不可剋伐補之自然能食許

學士云不能食者不可全作脾治腎氣虛弱不能消化飲食譬之釜中水穀下無火力其何能熟熱服用和云房勞過度真陽衰弱不能上蒸脾土中州不運以致飲食不進或脹滿痞塞或滯痛不消須知補腎腎氣若壯丹田火盛上蒸脾土脾土溫和中焦自治膈開能食矣

愚按脾胃者具坤順之德而有乾健之運故坤德或慙補土以培其卑監乾健稍弛益火以助其轉運故東垣謙甫以補土立言學士用和以壯火垂訓蓋有見乎土強則出納自如火強則轉輸不怠火者土之母也虛則補其母治病之常經每見世俗一遇不能食者便投香砂枳朴麴蘆香芽甚而用黃連山梔以爲開胃良方而天枉者多矣不知此皆實則瀉子之法因脾胃間有積滯有實火元氣未衰邪氣方張者設也虛而伐之則愈

虛虛而寒之遏真火生化之元有不敗其氣而絕其穀乎且誤以參朮爲滯悶之品畏之如砒鴆獨不聞經云虛者補之又云塞因塞用乎又不聞東垣云脾胃之氣實則枳實黃連瀉之虛則白朮陳皮補之乎故不能食皆屬脾虛四君子湯補中益氣湯效當補其母八味地黃丸二神丸挾痰宜化六君子湯挾鬱宜開育氣安異功散加子金宜顧肺金虛則盜竊土母之氣以自夫脾爲五臟之母土爲萬物之根安穀則昌絕穀則亡關乎人者至爲切亟慎毋少忽

醫案

文學倪念嵐羣勞積鬱胸膈飽悶不能飲食服消食之劑不效改而理氣又改而行痰又改而開鬱又改而清火半載之間藥餘百劑而病勢日增始來求治於余余先簡其方案次診其六

脉喟然嘆曰脉大而軟兩尺如絲明是火衰不能生土反以伐氣寒涼投之何異於人既入井而又下石乎遂以六君子湯加益智乾薑肉桂各一錢十劑而少甦然食甚少也余勸以加附子一錢兼用八味丸調補凡百餘日而復其居處之常

新安程幼安食少腹悶食粥者久之偶食蒸餅遂發熱作渴頭痛嘔逆或以傷寒治之或以化食破氣之藥投之俱不效勢甚危迫余診之謂其兄季涵曰脉無停滯之象按之軟且濇是脾上大虛之診也法當以參朮理之衆皆不然予曰病勢已亟豈容再誤遂以四君子湯加沉香炮薑與之數劑而減一月而安和中丸 開胃進食

人參

白朮

各三兩

乾薑

甘草

陳皮

木瓜

去穢各一兩

爲末水丸白湯送三錢

七珍散 開胃養氣補脾進食

人參

白木

酒炒各兩半

黃耆

蜜炙

白茯苓

砂仁

炒

陳黃米

炒焦黑各一兩

甘草

薑汁炒五錢

爲末每服三錢薑棗湯送

二神丸

破故紙補腎爲癸水肉豆蔻補脾爲戊土戊癸化火進食妙方

破故紙

炒四兩

肉豆蔻

生二兩

爲末肥棗四十九枚生薑四兩切片同煮爛去薑取棗剝反

核研膏爲丸桐子大每服三錢鹽湯下

育氣湯

木香

丁香

藿香

人參

白木

茯苓

砂仁

白豆蔻

華澄茄

甘草

炙各半兩

山藥

橘紅

青皮

去白各二錢半

白檀香

兩

為末每服二錢水瓜湯調下

資生丸

白朮泔浸上蒸九次晒九人參去蘆飯上蒸熟三兩山查肉蒸二

茯苓去皮飛去筋乳拌飯上蒸晒乾一兩五錢橘紅神麴炒各二兩川黃連蜜炙各

白豆蔻澤瀉各三錢桔梗炒藿香洗甘草蜜炙各

白扁豆殼炒去蓮肉去心各一兩薏苡仁淘沙三兩麥芽炒

芡實炒山藥炒各一兩五錢

為末蜜丸每丸二錢每服一丸淡薑湯磨服

汗睡則汗出醒則候收日盜汗不分

經云陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒陽有餘者身熱無汗陰有餘者陽不足故多汗身寒以汗本屬陰也○飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦

汗出於脾○血之與汗異名同類故奪血者無汗奪汗者無血

血與汗同奪則重傷其陰主死奪者迫之使出○腎病者寢汗憎風腎傷則陰虛故寢而盜汗出也

愚按心之所藏在內者爲血在外者爲汗汗者心之液也而腎主五液故汗證未有不繇心腎虛而得者心陽虛不能衛外而爲固則外傷而自汗腎陰衰不能內營而退藏則內傷而盜汗然二者之汗各有冷熱之分因寒氣乘陽虛而發者所出之汗必冷因熱氣乘陰虛而發者所出之汗必熱雖然熱火過極亢則害承乃制反兼勝已之化而爲冷者有之此又不可不察也至夫肺虛者固其皮毛黃耆六一湯玉屏風散脾虛者壯其中氣補中益氣湯君子心虛者益其血脉當歸六肝虛者禁其疎泄白芍藥仁烏梅腎虛者助其封藏五味山茱萸龍骨地骨皮五臟之內更有宜溫宜清宜潤宜燥豈容膠一定之法以應無窮之變乎

脉候 肺脉爽而散者當病灌汗 肺脉緩甚為多汗 尺澗

脉滑謂之多汗 尺滑澗而尺脉滑主陰傷也 若汗出如膠之 粘如珠之凝或淋漓如雨指拭不逮者難治

黃芪建中湯 治血氣虛而自汗

黃耆 肉桂 各一錢半 白芍藥 三錢 甘草 一錢

水二鍾煨薑五片棗二枚煎一鍾入稠飭一大匙再煎一沸

服舊有微瀉或嘔者不用飭

耆附湯 治氣虛陽弱自汗體倦

黃耆 去蘆蜜炙 附子 炮去皮 每服四錢水一鍾薑十片煎八分服

參附湯

人參 三錢 附子 炮去皮 水一鍾薑三片煎六分服

黃耆六一湯

黃芪 六兩去蘆蜜炙 甘草 一兩 每服五錢水一鍾棗一枚煎七分服

玉屏風散

防風

黃耆各兩

白朮二兩

每服三錢水一鍾薑三片煎六分服

白朮散 治虛風多汗少氣不治將成消渴

牡蠣

煨三錢

白朮

一兩二錢半

防風

二兩半

爲末每服一錢溫水調下

安胃湯 治汗出日久虛風痿痺

黃連

去鬚

五味子

烏梅肉

甘草

生各五分熟甘草三分

升麻稍二分

水二盃煎一杯服

正元散 治下元虛冷自汗厥逆嘔吐痛瀉

紅豆

炒

乾薑

炮

陳皮

去白各三錢

人參

白朮

甘草

炙

茯苓

去皮二兩

肉桂

去粗皮

川烏

炮去皮各半兩

附子

炮去皮尖

山藥

薑汁浸炒

川芎

烏藥

去木

乾葛

各一兩

黃耆炙兩半

為細末每服三錢水一鍾薑三片棗一枚鹽少

許煎七分食煎服

牡蠣散 治自汗盜汗

黃耆

麻黃根

牡蠣煨研各等分

每服三錢水一杯小麥一百粒煎六分服

大補黃耆湯

黃耆蜜炙

防風

山茱萸

川芎

當歸

白朮炒

肉桂

炙甘草

五味子

人參各一兩

白茯苓一兩半

熟地黃二兩

肉苁蓉酒浸三兩

每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分服

當歸六黃湯

治盜汗之聖藥

當歸

生地黃

熟地黃

黃蘗

黃芩

黃連各一錢

黃耆二錢

水二鍾煎一鍾臨卧服

盜汗良方

麻黃根

牡蠣

煨為粉

黃耆

人參

各二兩

龍骨打碎

地骨皮

各四兩

大棗

七枚

水六鍾煎二鍾半分六服一日飲盡

茯苓丸

治虛汗盜汗

白茯苓

去皮及膜

每服二錢煎烏梅陳艾湯調服

栝子仁丸

栝子仁

半夏

各二兩

牡蠣

煨為粉

人參

白朮

麻黃根

微炙

五味子

各一兩

淨麩

炒半

為末棗肉丸梧子大空心米飲下三錢

止汗法

川鬱金研細末臨卧以津調塗乳上

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣

煨各一兩

赤石脂

龍骨

各五錢

爲細末以絹包撲於身上

黃疸

經曰溺黃赤安臥者黃疸

論疾診尺篇曰身痛色微黃胸痞黃瓜甲黃黃疸也溺黃赤安臥脉小而

寒不嗜食正理論謂其得之也

已食如飢者胃疸

消穀善飢胃有熱也論疾

食寒也治疸者須知寒熱之別

目黃者曰黃疸

目者宗脉所聚諸經有熱上薰於目故黃疸者目黃

思按黃者中央戊己之色故黃疸多屬太陰脾經脾不能勝溼

復挾火熱則鬱而生黃譬之禽麴相似以溼物而當暑月又加

覆蓋溼熱相搏其黃乃成然溼與熱又自有別溼家之黃色暗

不明熱家之黃色光而潤亦有脾腎虛寒脉沉而細身冷自汗

瀉利溺白此名陰黃

茵陳蒿湯理中湯八味丸

汗出染衣色如檗汁此名

黃汗黃耆湯黃耆桂枝湯黃耆湯挾表者脉浮汗之而愈桂枝湯黃耆湯挾裏者腹脹

下之而安大黃硝石湯食傷有穀疸之名茯苓茵陳湯酒傷有酒疸之

治葛花解酲湯若夫御女勞傷則膀胱急而小便自利微汗出

而額上色黑手足心熱發以蒲暮加味四君子湯統言疸證清

熱導滯爲之主方茯苓滲濕湯假令病久脾衰胃薄必以補中參苓健

脉候脉洪泄利而渴者死脉小溺利不渴者生寸口近

掌處無脉口鼻冷者死疽毒入腹喘滿者死年壯氣實脉

大易愈老人氣虛脉微難瘥

茯苓滲淫湯清濕熱利小便

茵陳七分白茯苓六分木猪苓澤瀉白朮

陳皮蒼朮甘浸一夜炒透黃連各五分山梔炒秦艽

防已葛根各四分水二杯煎七分食前服

耆芍桂苦酒湯

黃耆 五兩

白芍藥

桂枝 各三兩

苦酒一升水七升煮三升溫服一升當心煩至六七日解若心煩不止苦酒阻故也

桂枝加黃耆湯 脈浮而腹中和者汗之

桂枝

白芍藥

生薑 各三兩

黃耆

甘草 各二兩

大棗 十二枚

水八升煮取三升服一升須臾飲熱稀粥一升以助藥力取微汗若不汗更服

黃耆湯 治黃汗身腫發熱不渴

黃耆

去蘆蜜炙

赤芍藥

茵陳蒿 各二兩

石膏

四兩

麥門冬

去心

淡豆豉

各一兩

甘草

炙半兩

每服四錢水一杯生薑五片煎七分服

大黃硝石湯一方加梔子十五枚

大黃

黃蘗

硝石

各四兩一作滑石

水六升煮取二升內硝煮取一升頓服

加減五苓散

茵陳

猪苓

去皮

白朮

赤茯苓

去皮

澤瀉

各二錢

水二鍾煎一鍾服

茯苓茵陳梔子湯

茵陳葉

一錢

茯苓

去皮五分

梔子仁

蒼朮

去皮炒

白朮

各三錢

黃芩

生六分

黃連

去鬚

枳殼

麩炒

猪苓

去皮

澤瀉

陳皮

漢防己

各二分

青皮

去白一分

水二杯煎一杯服

葛花解醒湯

見泄瀉

八味丸

理中湯

並見

四君子湯 治色疸及久疸不愈

人參

白朮

白茯苓

白芍藥

黃耆

白朮豆

炒各二錢

甘草

炙一錢

水二鍾薑五片紅棗二枚煎一鍾服

腎疸湯 治女勞成疸

升麻根

半兩

蒼朮

一錢

防風根

獨活根

白朮

柴胡根

羌活根

葛根

各五分

茯苓

猪苓

澤瀉

甘草根

各三分

黃檗

二分

人參

神麴

各六分

水二杯煎一杯食前服

參朮健脾湯

治久黃脾虛食少

人參

白朮

各一錢五分

白茯苓

陳皮

白芍藥

煨

當歸

酒洗各一錢

炙甘草

七分

水二鍾棗二枚煎八分服

色疸加黃者白朮豆

茵陳蒿附湯 治陰黃脉沉微小便利或瀉

附子炮去皮三錢 乾薑炮二錢 茵陳一錢二分 草豆蔻煨一錢 白朮四分

枳實熬炒 半夏製 澤瀉各五分 白茯苓 橘紅各三分

水二鍾生薑五片煎八分待冷服

蔓菁散 治陰黃汗染衣涕唾黃

蔓菁子 爲細末平旦以井華水服一匙日再加至兩匙以

知爲度每夜小便中浸少許帛子各書記日色漸白則瘥不

過服五升而愈

霍亂

經曰太陰所至爲中滿霍亂吐下又曰土鬱之發民病嘔吐霍

亂注下此二條言受淫霍亂也 歲土不及風乃大行民病霍亂

餐泄此言風未勝土而爲熱至 則身熱霍亂吐下此言火熱霍亂

足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別者入絡

腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則熱脹取之所別○

清氣在陰濁氣在陽營氣順脉衛氣逆行清濁相干亂於腸胃

則爲霍亂

此言厥氣上逆清濁不分飲食不節乃爲霍亂

愚按霍亂者揮霍變亂起於倉卒心腹大痛嘔吐瀉利憎寒壯

熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛肚瀉並

作甚者轉筋入腹則斃轉筋者以陽明養宗筋屬胃與大腸吐

囊縮舌卷陰陽反戾清濁相干陰陽否隔上下奔迫須遵內經

分濕熱風暑虛實而爲施治乾霍亂者心腹脹滿攪痛欲吐不

吐欲瀉不瀉躁亂昏憤俗名攪腸痧此繇脾土鬱極不得發越

以致火熱內擾不可過於攻過攻則脾愈虛不可過於熱過熱

則火愈熾不可過於寒過寒則火必捍格須反佐以治然後鬱

可開火可散古方用鹽熬調以童便不獨降火兼能行血極為

穩妥霍亂多起於夏秋之間皆外受暑熱內傷飲食所致從冬

之亦由夏轉筋者兼風木建中加木厥冷唇青兼寒氣建中加

薑身熱煩渴氣促兼暑熱桂苓白朮散體重骨節煩疼兼溼化

除濕風暑合病石膏理暑溼相搏二香多食寒冷六和湯倍霍

合情志鬱結七氣轉筋逆冷吳茱萸湯或邪在上者宜吐雖已

自吐利仍當吐之以提其氣用極鹹鹽湯三碗熱飲一碗指探

碗三吐乃止吐利不止元氣耗散病勢危篤或口渴喜冷或惡

寒逆冷或發熱煩躁欲去衣被此陰盛格陽不可以其喜冷欲

去衣被為熱效理中湯甚者附子理中湯不霍亂已透餘吐餘瀉

未止腹有餘痛煎服乾者尤佳保命集云有從標而得者有

從本而得者有從標本而得者六經之變治各不同細察色脉

知犯何經隨經標本活法施治此大法也

脉候 霍亂遍身轉筋肢冷腹痛欲絕脉洪易治脉微舌卷囊
縮者死 霍亂後陽氣已脫或遺尿不知或氣少不語或膏汗
如珠或大躁欲入水或四肢不收皆不可治
理中湯

人參

乾薑

白朮

各三錢

甘草

炙一錢

水二杯煎一杯服

加附子名附子理中湯

二香散

治暑溼相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香

白朮

厚朴

橘紅

茯苓

半夏

紫蘇

桔梗

白芷

香薷

黃連

扁豆

各一錢

大腹皮

甘草

各五分

水二杯薑五片葱白三根煎一杯服

香需散 霍亂諸證皆宜服之

厚朴 去皮 薑汁炒 黃連 薑汁炒 香薷 四兩 甘草 五錢

爲末每服四錢水煎不犯鐵器井中沉冷服

桂苓白朮散 暑食兩傷溼熱霍亂轉筋

桂枝 人參 白茯苓 白朮 各半 澤瀉

甘草 石膏 寒水石 各一兩 滑石 二兩

爲細末每服三錢薑湯下 一方有木香藿香葛根各半兩

除溼湯 見類 五苓散 見泄瀉 蘇合香丸 見中風

七氣湯 治七情鬱結霍亂吐瀉

半夏 湯洗 厚朴 白芍藥 茯苓 各二錢 桂心

紫蘇 橘紅 人參 各一錢

水二鍾生薑七片紅棗一枚煎一鍾服

吳茱萸湯 治胃暑或傷冷物或忍飢或大怒或乘舟車傷動胃氣轉筋逆冷

吳茱萸 木瓜 食鹽 各半兩

同炒焦水三升煮令百沸入藥煎至二升服如無藥用鹽一

撮醋一鍾煎八分服

通脉四逆湯

附子 大者一枚生用 乾薑 三兩強者四兩 甘草 炙二兩

水三升煮取一升一合分溫再服

建中加木瓜柴胡湯

桂枝 二兩半 芍藥 一兩 甘草 一兩 膠飴 半升 生薑 一兩半

大棗 六枚 木瓜 柴胡 各五錢

每服一兩水三杯煎杯半去渣下飴兩匙服

六和湯

香薷 一錢

砂仁

半夏 湯洗七次

杏仁 去皮尖炒 人參 去蘆

甘草 炙各五分

赤茯苓 去皮

白扁豆 薑汁炒

藿香 去土 厚朴 薑汁炒

木瓜 錢各一

水二杯 薑五片 紅棗一枚 煎一杯服

霍香正氣散 見中風

厚朴湯 治乾霍亂

厚朴 薑汁炒

枳殼 去瓢炒

高良薑

檳榔

朴硝 各七錢半

大黃 兩炒二

為末 每服三錢 水一杯 半煎一杯服

冬葵子湯 治乾霍亂二便不通 煩熱悶亂

冬葵子

滑石 研

香薷 各二兩

木瓜 一枚 去皮瓢

為末 每服五錢 水二杯 煎一杯 服五次

地漿法 於墻陰掘地約二尺許 入新汲水 攪之 澄清 服一杯

既取土氣 又取墻陰及新汲水 蓋陰中之陰 能治陽中之陽

嘔吐噦

有聲有物為嘔
有聲無物為噦

有物無聲為吐

經曰諸逆衝上皆屬於火諸嘔吐酸皆屬於熱火性炎上故逆

諸藏諸經各有逆氣則陰陽虛實各自不同實火可為肝連之

味也火盛金傷不能制木則肝木自其在素問則以為熱東垣

又以吐酸為寒何也經言始受熱中東垣言未傳寒中總之壯

盛人多熱虛弱人多寒若不○寒氣客於腸胃厥逆上出故痛

以虛實形證為辨非醫矣而嘔此經之言嘔食則嘔者物盛滿而上溢脾不能運化精微

證也足太陰病舌本強食則嘔脾脈連於舌本故寒氣與新穀氣

俱還入於胃新故相亂真邪相攻氣并相逆復出於胃故為噦

東垣以有聲無物為噦蓋指乾嘔也而內經所為噦者蓋呃逆也即其論鍼刺者有云病深者其聲噦又曰噦者以草刺鼻嚏

而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已此皆治呃逆之法每試而必效者也

愚按古人以嘔屬陽明多氣多血故有聲有物氣血俱病也吐

屬太陽多血少氣故有物無聲血病也噦屬少陽多氣少血故

有聲無物氣病也獨東垣以嘔吐噦俱屬脾胃虛弱或寒氣所
客或飲食所傷致上迎而食不得下也潔古老人從三焦分氣
積寒三因上焦在胃口上通天氣主納而不出中焦在中脘上
通天氣下通地氣主熟腐水穀下焦在臍下下通地氣主出而
不納故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其證
食已卽吐渴欲飲水治當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰
有陽氣食相假其脉浮而弦其證或先痛後吐或先吐後痛法
當去積和氣下焦吐者皆從於寒地道也其脉大而遲其證朝
食暮吐暮食朝吐小便清利大便不通法當通其閉塞溫其寒
氣後世更爲分別食剝則吐謂之嘔剝者頃刻也食纔入口食
入則吐謂之暴吐食纔下咽卽便吐食已則吐謂之嘔吐食畢
吐橘皮食久則吐謂之反胃食久則既入於胃矣胃中不能別
半夏湯清濁化精微則復反而出水者金

花食再則吐謂之翻胃初食一次不吐也第二次食下則吐直

旦食暮吐暮食朝吐積一日之食至六時之久然後吐以上諸證

吐愈速則愈在上吐愈久則愈在下陰陽虛實之間未易黑白

判也古方通以半夏生薑為正劑獨東垣云生薑止嘔但治表

實氣壅若胃虛穀氣不行惟當補胃推揚穀氣而已故服小半

夏湯不愈者服大半夏湯立愈挾寒者喜熱惡寒肢冷脉小

陳湯加丁香炮薑或理中湯加枳實並須水挾熱者喜冷惡熱

躁渴脉洪二陳湯加黃連梔子根汁氣滯者脹滿不通二陳湯

沉香痰飲者遇冷即發俗名冷涎以順氣之藥食積者消導

乃安枳實厚朴蒼朮神吐而諸藥不效必假鎮重以墜之靈砂

正吐而中氣久虛必借穀食以和之宜白米炒焦黑色陳皮茯苓

穀藥時時陳米飲先吐後瀉身熱腹悶名曰漏氣此因上焦傷風邪二

呷陳米飲氣內蓄麥門冬湯

便不通氣逆不續名曰走哺

此下焦實熱人參湯主之

乾嘔氣逆

橘皮生薑等分惡

心胃傷

虛者人參橘紅茯苓甘草半夏生薑實者枳殼砂仁橘紅半夏白蘘藿香嘔苦邪在胆經連

甘草生薑

橘皮柴胡吐酸責之肝臟

挾熱者左金丸加白蘘藿生薑竹茹梔子挾寒者左金丸加丁香香乾薑白朮

沉香嘔清水者多氣虛

六君子湯加赤石脂

吐蚘蛭者皆胃冷

理中湯加川椒五粒枳殼

五分吞

烏梅丸詳別其因對證用藥不膠一定之跡可應無窮之變耳

脉候

陽緊陰數爲吐陽浮而數亦爲吐

寸緊尺濇胸滿而

吐寸口脉數者吐

緊而濇者難治

緊而滑者吐逆

脉

弱而嘔小便復利身有微熱見厥者死

嘔吐大痛色如青菜

葉者死

醫案

兵尊高玄圃久患嘔吐閱醫頗衆病竟不減余診之曰氣口大而軟此穀氣少而藥氣多也且多犯辛劑可以治表實不可以

治中虛可以理氣壅不可理氣弱投以熟半夏五錢人參三錢
陳倉米一兩白蜜五匙甘瀾水煎服二劑減十劑安

屯院孫瀟湘夏月食瓜果過多得食輒嘔十日弗止舉家驚惶
千里迎余比至署中已二十日矣困頓床褥手足如冰余曰兩
尺按之有神胃氣縷縷不絕祇因中氣本弱復為寒冷所傷耳
遂用紅豆丸連進三服至明日便能食粥兼與理中湯加丁香
沉香旬日之間飲食如常

小半夏湯 治嘔定吐開胃消食

半夏湯洗 生薑留皮各三錢 水一鍾煎六分服加橘皮各橘皮半夏湯

大半夏湯 治胃虛嘔吐

半夏五錢湯洗 人參三錢 白蜜二錢

水二碗和蜜揚之二百四十遍煮八分溫服

薑橘湯

橘皮

去白

生薑

留皮各三錢

水一鍾煎六分服

水煮金花丸

二陳湯

俱見

理中湯

見傷寒

紫沉丸

治中焦吐食積寒氣作痛

砂仁

半夏麴

各三錢

烏梅

去核

丁香

檳榔

各二錢

陳皮

五錢

沉香

杏仁

去皮尖炒

白朮

木香

各一錢

白豆蔻

巴豆霜

各五分另研

爲細末醋糊丸黍米大每服五

十九食後薑湯下反胃用橘皮去白以生薑麴裏紙封燒令

熱去麴煎湯下紫沉丸一百粒一日二服

半夏生薑大黃湯

半夏

大黃

各二兩

生薑

半兩

水五升煮取三升再服

紅豆丸

治嘔逆膈氣反胃吐食

丁香

胡椒

砂仁

紅豆各二十粒

為細末薑汁糊丸皂角刺大每服一九以大棗一枚去核填

藥麵裏煨熟去麵細嚼白湯下日三服

靈砂丹

治上盛下虛痰盛吐逆此丹最能鎮

水銀一觔

硫黃四兩

右二味用新銚內炒成砂子入水火

鼎煨煉為末糯米糊丸麻子大每服三九空心棗湯米飲并

花水人參湯任下忌猪羊血菜豆粉冷滑之物

養正丹

見中風

六君子湯

見虛烏梅丸

見傷寒

麥門冬湯

治漏氣上焦傷風膝理開經氣失道邪氣內着身背熱肘臂痛悶而吐瀉

麥門冬去心

生蘆根

竹茹

白朮

各五兩

甘草炙

茯苓

各二兩

人參

陳皮

威蕤

各三兩

每服四錢水鍾半薑五片陳米一撮煎七分服

走哺人參湯 治大小便不通下焦實熱

人參

黃芩

知母

威靈

各半錢

蘆根

竹茹

白朮

梔子仁

陳皮

各半兩

石膏

一兩

每服四錢水鍾半煎七分服

左金丸

治肝火吐酸水名左金者使金令左行則肝木有制也

黃連

吳茱萸

各一兩同拌

右爲細末粥丸煎白朮陳皮湯下二錢

醫宗必讀卷之十終